

Pterijyum Cerrahisinde Fibrin Doku Yapıştırıcısı ve Vikril Sütür Tekniği

Fibrin Tissue Adhesive and Vicryl Suture Technique in Pterygium Surgery

Meydan Turan¹,

¹Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Göz Kliniği, Balıkesir, Türkiye

Geliş Tarihi/Received: 14 Mart 2020
Kabul Tarihi/Accepted: 19 Mayıs 2020

Yazışma Adresi: Meydan Turan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Göz Kliniği, Balıkesir, Türkiye
e-mail: meydanturan@gmail.com

ORCID

Meydan Turan

<https://orcid.org/0000-0001-6593-9025>

Öz

Amaç: Kliniğimizde otogreftli pterijyum cerrahisinde uyguladığımız fibrin doku yapıştırıcısı ve vikril sütür tekniğinin karşılaştırılması amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Haziran 2016 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında ameliyatı yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak gözden geçirildi. Çalışmaya vikril sütür ile otogreftli pterijyum cerrahisi yapılan 72 hasta (Grup 1), (primer pterijyumlar Grup 1a, Nüks pterijyumlar Grup 1b), fibrin doku yapıştırıcısı kullanılarak otogreftli pterijyum cerrahisi yapılan 58 hasta (Grup 2), (primer pterijyumlar Grup 2a, Nüks pterijyumlar Grup 2b) dahil edildi. Her iki grupta cerrahi işlem süreleri ve komplikasyonlar not edildi. SPSS, 20.0 versiyon istatistik analiz programı kullanıldı. Veriler bağımsız örneklem t testi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Gruplara dahil edilen hastaların yaşları Grup 1'de 37 ile 65 yıl arasında olup, ortalama yaş 47.04±5.70 yıl iken, Grup 2'de 38 ile 57 yıl arasında olup ortalama yaş 47.10±4.88 yıl idi. Gruplar arasında hastaların yaşı değerlendirildiğinde anlamlı fark görülmedi (p= 0.95). Ameliyatın ortalama süresi grup 1a, 1b, 2a ve 2b'de sırasıyla 24.91 ± 3.08 dk, 25.60 ± 2.20 dk, 17.62 ± 2.57 dk ve 18.84 ± 2.83 dk idi. Grup 1a ve 1b (p= 0.021), grup 2a ve 2b (p = 0.001), grup 1 ve 2 (p <0.001) arasında ameliyat süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Nüks pterijyumda her iki teknikte de daha fazla cerrahi süresi gerektirdiği tespit edildi. Her iki grupta hastalarda nüks görülmedi.

Sonuç: Otogreftli pterijyum cerrahisi, pterijyumda güvenilir, nüks oranı düşük bir cerrahi yöntemdir. Fibrin doku yapıştırıcısı ile yapılan otogreftli pterijyum cerrahisi daha kısa cerrahi süresine olanak sunması nedeniyle tercih edilebilecek bir yöntem olduğunu düşünmekteyim.

Anahtar Kelimeler: Otogreft, Pterijyum, Fibrin doku yapıştırıcısı, Konjonktiva, Nüks.

Abstract

Aim: The aim of this study was to compare the fibrin tissue adhesive technique with vicryl suture technique in autograft pterygium surgery.

Patients and Methods: The files of the patients who underwent surgery between June 2016 and August 2019 were retrospectively reviewed. Seventy two patients (Group 1) who underwent autograft pterygium surgery with vicryl suture technique (Primary pterygium Group 1a, recurrent pterygium Group 1b) and 58 patients who underwent autograft pterygium surgery with fibrin tissue adhesive technique (Primary pterygium Group 2a, recurrent pterygium Group 2b) were included.

Results: The mean age of the patients was 47.04±5.70 years (ranging between 37-65) in Group 1 and 47.10±4.88 years (ranging between 38-57) in Group 2. There was not a statistically significant difference in terms of age between two groups (p=0.95). The mean duration of the surgery was 24.91±3.08 min, 25.60±2.20 min, 17.62±2.57 min, and 18.84±2.83 min in groups 1a, 1b, 2a and 2b, respectively. There were statistically significant differences in terms of the duration of the surgery between groups 1a and 1b (p=0.021), groups 2a and 2b (p=0.001), groups 1 and 2 (p<0.001). Recurrence pterygium was found to require more surgery time in both techniques. Postoperative recurrence was not observed in any of the patients.

Conclusion: Pterygium surgery with conjunctival autograft is a reliable surgical method with low recurrence rates. The duration of surgery in recurrent pterygium was found to be longer in both surgical techniques. It is concluded that autograft pterygium surgery with fibrin tissue adhesive is the preferred surgical method that shortens the duration of the surgery.

Key words: Autograft, pterygium, fibrin tissue adhesive, conjunctiva, recurrence

Atıf yapmak için: Turan M. Pterijyum Cerrahisinde Fibrin Doku Yapıştırıcısı ve Vikril Sütür Tekniği. Selcuk Med J 2020;36(4): 307-311

Açıklama: Yazar bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi. Yazar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedir.



"This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) (CC BY-NC 4.0)"

GİRİŞ

Pterijyum, bulber konjunktivanın genellikle nazalden korneaya doğru uzanması sonucu oluşan, üçgen şeklinde fibrovasküler dejeneratif bir dokudur (1,2) Etiyolojide birçok etkenin olduğu bilinmektedir. Sıcak, kuru, rüzgarlı iklime ve yüksek UV radyasyonuna maruz kalan coğrafi bölgelerde pterijyum oluşumu yüksektir (3). Erken evre pterijyumlar da genellikle semptomatik tedavi (suni gözyaşı preparatları, antialerjik damlalar vs.) ile geçici rahatlık sağlansa da orta ve ileri evre pterijyumlarda günümüzde tek tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi tedavide bilinen eski yöntemlerden olan “çıplak sklera tekniği” kullanılmaktadır. Bu teknik ile cerrahi sonrası en sık komplikasyon nüks olup, nüks oranı %70-90 düzeyinde tespit edilmiştir (4). Yüksek nüks oranı alternatif cerrahi seçenekleri ortaya çıkarmıştır. Günümüzde daha yaygın olarak kullanılan cerrahi yöntem otogreftli pterijyum cerrahisidir. Bu teknikle birçok alternatif yöntem geliştirilmiştir. Bunlar arasında otogreftin sütürasyonu, yapıştırılması, amnion zarı ile kapatılması, otogreftin yanı sıra yardımcı ilaçların uygulanması yer almaktadır (5-7). Fibrin doku yapıştırıcısı doğal fibrinojen ile trombin reaksiyonunu taklit eden ve birçok cerrahi branşta kullanılan 2 bileşenli yapıştırıcıdır (8).

Bu çalışmada primer ve nüks pterijyum tanısıyla otogreftli pterijyum cerrahisi yapılan hastalarda, konjunktival otogreftin vikril sütür tekniği ve fibrin doku yapıştırıcısı kullanılarak fikse edilmesinin etkinlikleri karşılaştırıldı.


HASTALAR VE YÖNTEM

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde Haziran 2016 - Ağustos 2019 tarihleri arasında primer ve nüks pterijyum tanısı ile otogreftli pterijyum cerrahisi uygulanan hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya başlamadan önce Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurulundan izin alındı (Karar no 2020/35). Vikril sütür tekniği ile otogreftli pterijyum cerrahisi uygulanan 72 hasta Grup 1, fibrin doku yapıştırıcısı kullanılarak otogreftli pterijyum cerrahisi uygulanan 58 hasta Grup 2 olarak ayrıldı. Grup 1'deki hastalar, primer pterijyumlu 47 hasta Grup 1a ve nüks pterijyumlu 25 hasta Grup 1b olarak iki gruba ayrıldı. Grup 2'deki hastalar, primer pterijyumlu 39 hasta Grup 2a ve nüks pterijyumlu 19 hasta Grup 2b olarak iki gruba ayrıldı. Grupların cerrahi süresi, komplikasyon oranları değerlendirildi. Tüm cerrahiler tek bir cerrah tarafından yapılmıştır.


Çalışmaya primer ve nüks pterijyum olan hastalar dahil edilirken oküler yüzeye alkali yanık hikayesi, kapak malpozisyonu (ektropiyon, entropiyon) olanlar dahil edilmedi.

Cerrahi teknik: Tüm hastalara subkonjunktival enjeksiyon lidokain hidroklorür+Adrenalin (JetokainR (Adeka)) uygulanarak lokal anestezi sağlandı. Pterijyum dokusu konjunktiva pensi yardımı ile gövde kısmından tutularak kornea yüzeyinden kaldırıldıktan sonra kornea yüzeyinde kalan parçalar kresent bıçak yardımı ile kornea santralinden limbusa doğru eksize edildi. Kornea yüzeyinden ayrılan pterijyum dokusu sklera üzerindeki kısmı ile beraber konjunktiva makası yardımı ile eksize edildi. Kanama kontrolü sağlandı. Superior kadrandan alınan limbal konjunktival otogreft Grup 1'de vikril sütür kullanılarak Grup 2'de Fibrin doku yapıştırıcı (TISSEELR (EIP Eczacıbaşı)) kullanılarak skleral yatak üzerine fikse edildi (Şekil 1). Grup 2'de greft ile konjunktiva yara dudakları birbirine temas edecek şekilde forceps yardımı ile yapıştırıldı. Operasyondan sonra hastalara 2 hafta boyunca netilmisin sülfat ve deksametazon disodyum fosfat (NetildexR SIFI S.P.A.) 4x1 damla kullanıldı. Hastalar 1. gün, 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ayda kontrol edildi (Şekil 1, 2).

Komplikasyonlar intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar olarak ayrıldı. Hemoraji, greftin açılması, korneal lezyon, inflamasyon, greftin



Şekil 1. Fibrin yapıştırıcı uygulanmış hastanın intraoperatif görünümü.



Şekil 2. Fibrin yapıştırıcısı uygulanmış hastanın postoperatif 1. hafta görünümü.

retraksiyonu ve nüks açısından değerlendirildi. Nüks pterijyum, limbusu 1 mm aşan fibrovasküler doku olarak tanımlandı.

İstatistiksel Analizde, SPSS analiz programı 20.0 versiyonu kullanıldı. Gruplar arasında ki karşılaştırma için bağımsız örneklem t testi kullanılarak yapıldı. P

değeri <0.05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Hastaların yaşları değerlendirildiğinde Grup 1a ortalama 47,30±4,78, (37-56) yıl iken Grup 1b ortalama 46,56±7,2, (37-65) yıl idi. Grup 2a'da ortalama 48,49±4,83, (38-57) yıl iken Grup 2b'de ortalama 44,26±3,66, (38-49) yıl idi. Grup 1 ve 2 arasında yaş açısından anlamlı fark görülmedi (p=0.95). Grup 1'de ortalama cerrahi işlem süresi 25,15±2,81, (18-35) dakika (dk) iken grup 2'de 17,98±2,68, (14-23) dk. idi. Grup 1 ve Grup 2'deki hastaların cerrahi işlem süreleri değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p< 0,001), (Tablo 1). Hem Grup1a ve Grup 1b, hemde Grup 2a ve 2b'de cerrahi işlem süresi nüks pterijyumda anlamlı olarak daha uzun idi (p= 0,021, <0,001, sırasıyla). Hastaların takip süreleri (ay) değerlendirildiğinde en kısa takip süresi 6 ay, en uzun takip süresi 37 ay idi (Tablo 2). Grup 1'de ortalama takip süresi 25,69±8,03 ay iken, Grup 2'de 12,24±3,78 ay idi.

İntraoperatif hemoraji, hiçbir olguda koter kullanmamızı gerektirecek kadar olmadı. Ancak postoperatif 1. hafta kontrollerinde 2 (%2,8) hastanın Grup 1'de, 2 (%3,4) hastanın Grup 2'de greft altına kanamasının olduğu görüldü. Bu komplikasyon iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,82). 1. ay kontrollerinde hemorajinin kaybolduğu görüldü. Greftin açılması komplikasyonu değerlendirildiğinde

Tablo 1. Grupların minimum ve maksimum cerrahi işlem süreleri ve ortalama işlem süresi.

Grup	Hasta Sayısı (n)		Minimum (dk)		Maximum (dk)		Ortalama (dk)		Standart sapma	P değeri
	1a	1b	1a	1b	1a	1b	1a	1b		
Grup 1	47	72	18	35	18,0	35,0	24,91	25,15	3,08	0,021
	25	25	20,0	30,0	25,60	2,20				
Grup 2	39	58	14	23	14,0	23,0	17,62	18,98	2,57	<0,001
	19	19	14,0	23,0	18,84	2,83				

Tablo 2. Grupların minimum ve maksimum takip süreleri ve ortalama takip süresi.

Grup	Hasta Sayısı (n)		Minimum (ay)		Maximum (ay)		Ortalama (ay)		Standart sapma	
	1a	1b	1a	1b	1a	1b	1a	1b		
Grup 1	47	72	8,0	37	8,0	37,0	28,91	25,69	7,12	8,03
	25	25	9,0	29,0	19,64	5,94				
Grup 2	39	58	6,0	19	6,0	19,0	12,49	12,41	4,15	3,71
	19	19	6,0	17,0	11,74	3,41				



Şekil 3. Fibrin yapıştırıcı uygulanmış hastanın 1. Ay görünümü.

Grup 1'de 3 (%4,2) hastanın sütürlerinde açılma olduğu, Grup 2'de 1 (%1,7) hastanın greftinde kayma olduğu görüldü. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0,21$). Greftinde kayma olan hasta tekrar fibrin doku yapıştırıcı ile yapıştırıldı. Korneal dokunun tüm hastalarda 1. hafta kontrolünde epitelize olduğu görüldü. İnflamasyon açısından değerlendirildiğinde Grup 1'de 2 (%2,8) hastada konjonktival otogreftin inflame olduğu ancak 1. ay kontrolünde iyileşmiş olduğu görüldü. Çalışmamıza dahil edilen hastalarda hem Grup 1 hem de Grup 2'de takip süresi boyunca nüks görülmedi.

TARTIŞMA

Pterijyum cerrahisinde ilk cerrahi yöntem olan çıplak sklera tekniğinin nüks oranının yüksek olması nedeniyle alternatif cerrahi yöntemler düşünülmüştür. Pterijyum cerrahisinde konjonktival otogreft yöntemi ilk defa 1985 yılında Kenyon et al. (9) tarafından tanımlanmıştır. Cohen et al. (10) tarafından 1993 yılında pterijyum cerrahisinde fibrin doku yapıştırıcı kullanımını tanımlamıştır. Çalışmamızda hem primer pterijyumda hemde nüks pterijyumda, vikril sütür ve fibrin doku yapıştırıcı kullanılarak otogreftli pterijyum cerrahisi yapılan hastalar karşılaştırıldı. Otogreftin yerleştirilmesi sütürle yapıldığı zaman cerrahi süresinde uzama, hasta uyumsuzluğu, sütüre bağlı şikayetler ortaya çıkabilmektedir (11). Bahar et al. (12) konjonktival otogreft pterijyum cerrahisinde fibrin doku yapıştırıcı ve sütür kullanarak yaptıkları çalışmalarında, fibrin doku yapıştırıcı kullandıkları grupta cerrahi süresinin daha kısa ve ameliyat sonrası rahatsızlık hissinin daha az olduğunu tespit etmişlerdir.

Çalışmamızda cerrahi süresi değerlendirildiğinde, en uzun süre vikril sütür tekniği ile nüks pterijyum ameliyatı yapılan grupta olduğu görüldü. En kısa cerrahi süresinin fibrin doku yapıştırıcı ile yapılan primer pterijyumlu grupta olduğu görüldü.

Özdamar et al. (13) yaptıkları çalışmada fibrin doku yapıştırıcı tekniği ile pterijyum cerrahisi uygulanan grupta hasta konforunun daha iyi olduğunu bulmuş ve takip süresi boyunca her iki grupta da nüks gözlenmediğini bildirmişlerdir. Literatürde yapılan diğer çalışmalar değerlendirildiğinde, Dadeya et al. (14) transpozisyonel flep tekniği ile yaptıkları pterijyum cerrahisinde, cerrahi sürenin otogreft yönteminden daha kısa olduğunu gözlemleyerek rotasyonel flep için % 5.58 ve otogreft için %5.55 nüks oranları ile önemli miktarda cerrahi zaman tasarrufu sağladığını bildirmişlerdir. Bununla birlikte, Wu et al. (15) transpozisyonel flep tekniğinden sonra nüks oranını % 35 olarak bildirmişlerdir. Ma et al. (16) retrospektif olarak yaptıkları çalışmada, primer pterijyum eksizyonundan sonra amniyotik membranın etkinliğini ve güvenilirliğini, konjonktival otogreft ve topikal % 0.02 mitomisin C ile karşılaştırdıklarında, gruplar arasında rekürrens oranlarında anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda hem vikril sütür tekniği hemde fibrin doku yapıştırıcı tekniği uygulanan grupta takip süresi içinde nüks görülmedi.

Otogreftli pterijyum cerrahisinde vikril sütür yöntemi kullanılıyor ise yerleştirilen greftin gergin olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla alınan greftin skleral alanı yeterince kapatacak büyüklükte olması gerekir. Aksi takdirde sütürlerde açılma meydana gelebilir. Çalışmamızda 3 hastanın gergin grefte bağlı sütürlerinde açılma olduğu görüldü. Benzer şekilde fibrin yapıştırıcı kullanılan hastalarda da otogreftin yeterince büyük olması postoperatif greftin kayması ve açılmasını engelleyecektir. Greft kaymasını önlemek için postoperatif 48 saat sıkı bandaj uygulaması faydalı olabilir (17). Ayrıca hastalar gözünü hem oluşan rahatsızlıktan dolayı ovalamaktan, hemde travmadan koruması hususunda özellikle uyarılmalıdır. Çalışmamızda 1 hastanın 1. hafta kontrolünde, greftinde kayma olduğu gözlemlendi. Hastanın grefti tekrar yapıştırıldı.

SONUÇ

Otogreftli pterijyum cerrahisi, pterijyumda güvenilir, nüks oranı düşük bir cerrahi yöntemdir. Fibrin doku yapıştırıcı ile yapılan otogreftli pterijyum cerrahisi daha kısa cerrahi süresine olanak sunması nedeniyle tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Çıkar Çatışması: Çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Finansal Çıkar Çatışması: Çalışmada herhangi bir finansal çıkar çatışması yoktur.

Yazışma Adresi: Meydan Turan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Göz Kliniği, Balıkesir, Türkiye

e-mail: meydanturan@gmail.com

KAYNAKLAR

- Grimmet MR, Holland EJ. Management of pterygium. In: Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ, eds. Cornea, surgery of cornea and conjunctiva. Vol III, Mosby: St. Louis, Philadelphia, 1997:1873-5.
- Hillgers JHC. Pterygium: Its incidence, heredity and etiology. Am J Ophthalmol 1960;50:635-44.
- Cárdenas-Cantú E, Zavala J, Valenzuela J, et al. Molecular basis of pterygium development. Semin Ophthalmol 2016;31:567-83.
- Starck T, Kenyon KR, Serrano F. The management of ptergium. Cornea 1991;10:611-23.
- Elmas K, Katircioğlu Y, Aslan BS, et al. Primer pterijyum rezeksiyonunda amniyon grefti, konjonktival otogreft ve primer kapama tekniklerinin karşılaştırılması. Turk J Ophthalmol 2002;32:337-42.
- Tananuvat N, Martin T. The results of amniotic membrane transplantation for primary pterygium compared with conjunctival autograft. Cornea 2004;23:458-63.
- Katircioğlu YA, Altıparmak UE, Duman S. Comparison of three methods for the treatment of pterygium: Amniotic membrane graft, conjunctival autograft and conjunctival autograft plus mitomycin C. Orbit 2007;26:5-13.
- Schlag G, Aschler PW, Steinkogler FJ, et al. Fibrin sealing in surgical and nonsurgical fields, Vol 5. Neurosurgery, ophthalmic surgery, ENT. Berlin: Springer Verlag 1994:97-106.
- Kenyon KR, Wagoner MD, Hettinger ME. Conjunctival autograft transplantation for advanced and recurrent pterygium. Ophthalmology 1985;92:1461-70.
- Cohen RA, McDonald MB. Fixation of conjunctival autografts with an organic tissue adhesive [letter]. Arch Ophthalmol 1993;111:1167-8.
- Esen D, Ozkan MH, Buttanrı BI, et al. Pterijyum cerrahisinde fibrin yapıştırıcısı ile konjonktivalimbal otogreft uygulaması. TJO 2010;40:266-70.
- Bahar I, Weinberg D, Dan G, et al. Pterygium surgery: Fibrin glue versus vicryl sutures for attaching closure. Cornea 2006;25:1168-72.
- Ozdamar Y, Mutevelli S, Han U, et al. A comparative study of tissue glue and vicryl suture for closing limbal-conjunctival autografts and histologic evaluation after pterygium excision. Cornea 2008;27:552-8.
- Dadeya S, Malik KP, Gulliani BP. Pterygium surgery: Conjunctival rotation autograft versus conjunctival autograft. Ophthalmic Surg Lasers 2002;33:269-74.
- Wu WK, Wong VW, Chi SC, et al. Surgical management of double-head pterygium by using a novel technique: Conjunctival rotational autograft combined with conjunctival autograft. Cornea 2007;26:1056-9.
- Ma DH, See LC, Liao SB, et al. Amniotic membrane graft for primary pterygium: Comparison with conjunctival autograft and topical mitomycin C treatment. Br J Ophthalmol 2000;84(9):973-8.
- Gong J, Fan J, Shen T, et al. Comparison of self-made cryopreservative fibrin glue and commercial fibrin glue kit in pterygium surgery: 1-year follow-up. Acta Ophthalmol 2018;96:e152-e155.