

# Yeni doğanlarda 2-4 parmak oranının araştırılması

M. ALİ MALAS<sup>1</sup>, Erkan ATAŞ<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ISPARTA

<sup>2</sup>Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi, KONYA

**Özet:**Yenidoğanlarda 2-4 parmak oranının araştırılması. **Amaç:** Çalışmamızda miadında, düşük doğum ağırlıklı ve pre-matüre yenidoğanlar da el ölçümleri ve ikinci ile dördüncü parmak ölçümleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlandı. **Gereç ve yöntem:** Yaşları 29-37 gebelik haftası arasında değişen 60 prematüre yenidoğan (Erkek 30, Kız 30), 60 miadında yenidoğan (Erkek 30, Kız 30) ve 60 düşük doğum ağırlıklı yenidoğan (Erkek 30, Kız 30) olgu çalışmaya alındı. Bütün vakalarda el uzunluğu, el genişliği, 2. parmak uzunluğu, 4. parmak uzunluğu, 2-4 parmak [(2. parmak uzunluğu ÷ 4. parmak uzunluğu) x 100] ve el indeksi [(el genişliği ÷ el uzunluğu) x 100] belirlendi. **Bulgular:** El ölçümlerinde miadında olan yenidoğanlar da daha büyük olmak üzere gruplar arasında istatistiksel bakımdan farklılıklar tespit edildi (p<0.05). Miadında yenidoğanlar da el genişliğinde ve 2. parmak uzunluğunda kızlarda daha uzun olmak üzere cinsler arasında farklılık belirlendi (p<0.05). Bütün gruplarda alınan parametreler arasında müspet yönde korelasyon bulundu. Ayrıca kızların 2/4 parmak indeksi miadında yenidoğanlarda daha yüksek bulundu. Miadında yenidoğanlarda el ve parmak indeksi cinsler arasında farklıydı. **Sonuç:** Prematüre, miadında ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda el ve ikinci ile dördüncü parmak parametrelerinin daha fazla tanımlanması ile bireysel varyasyonlar hakkında daha fazla bilgi sunulmuş olacaktır. İkinci ile dördüncü parmak varyasyonları hakkındaki bilgiler iskelet ve endokrin sistem gelişimindeki patolojilerin veya anomalilerin teşhis edilmesinde yardımcı olabilir.

**Anahtar kelimeler:** El, el parmakları, yenidoğan, morfometri.

Selçuk Tıp Derg 2005; 21:5-10

## SUMMARY

### An investigation of the ratio between second and fourth fingers in newborns

**Purpose:** In this study, we aimed to determine the measurements and the relation between measured parameters of hand, second and fourth finger in full term, newborn with low birth weight and premature newborns. **Materials and method:** We were studied 60 premature newborns (Male 30, Female 30) who were aged between 29 and 37 post menstrual week, and 60 full term newborns (Male 30, Female 30), and 60 newborn with low birth weight (Male 30, Female 30). In all cases, hand length, hand width, second and fourth finger lengths, hand index [(hand width ÷ hand length) x 100] and second-fourth finger index [(2nd finger length ÷ 4th finger length) x 100] were measured. **Results:** The measurements of hand and finger were significantly different between groups in whom it was greater in full term newborns (p<0.05). There were differences in the hand width, second finger lengths in full term newborns between sexes (p<0.05). A significant positive correlation between the hand and finger dimensions was found in the all groups. Furthermore, the second/fourth finger index of male was higher in full term newborns. Hand index and second-fourth finger index were differences between male and female in in full term newborn. **Conclusions:** With more expressions of the parameter of hand and second-fourth finger at premature and full term newborns and newborn with low birth weight, the possibility of more information about individual variations will be given. Knowledge about normal variations in hand and second-fourth finger dimensions can help in diagnosis of pathologies or anomaly of skeleton and endocrine development.

**Key words:** hand, hand fingers, newborn, morphometry

İskelet sisteminin gelişimi diğer sistemlerde olduğu gibi bir düzen içinde olmaktadır. Üst ekstremiteler embriyonal dönemin 26-27. günleri arasında oluşmaya baslar. Fetal dönemin 21-24. haftaları arasında el ve el tırnağı gelişimi olur (1-2). Fetal ekstremitte gelişimi ile ilgili olarak bir çok ultrasono-

grafik çalışma bulunmaktadır. Bunların birçoğu erken evrede intrauterin gelişim geriliğini tespit etmeyi, fetal ağırlığı yada gestasyonel yaşı belirlemeyi hedeflemektedir (2). Bu çalışmaların bir kısmında kemik gelişimi ile hormonlar arasındaki ilişki ortaya konmuş ve bazı hastalıkların belirleyicisi

Haberleşme Adresi: **Dr. Mehmet Ali MALAS** Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  
ISPARTA e-posta: mamalas@hotmail.com

Geliş Tarihi : 15.2.2005

Yayına Kabul Tarihi : 26.4.2005

olarak gösterilmiştir (3-6). Robinson SJ. ve ark. (3) elde 2. parmağın 4. parmağa olan oranının pozitif olarak östrojenle, negatif olarak testosteronla ilgili olduğunu tespit etmişler, ayrıca fetal testosteron ve homoseksüel erkekler arasındaki ilişkiye de dikkat çekmişlerdir. Manning JT ve ark. (4-6)'da bu bulguları desteklemektedir. Firman RC ve ark. (7) parmak oranlarının düşük olması ile infertilite arasında ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Kjaer MS ve ark. (8) el gelişiminin Down Sendromu ile ilişkisini değerlendirmiş ve besinci parmağın orta falanksının Down Sendromunda en son oluştuğunu belirtmişlerdir. Manning JT ve ark. (5) Down Sendromlu çocuklarda 2. parmak/4. parmak (2/4) oranının daha düşük olduğunu bulmuşlar ve bu oranın Down Sendromu için işaret olabileceğini bildirmişlerdir. Brown WM. ve ark. (9) konjenital adrenal hiperplazi (KAH)'li kadınların sağ ellerindeki 2/4 oranı KAH'siz kadınlarınkinden, KAH'li erkeklerin sol ellerindeki 2/4 oranı KAH'siz erkeklerinkinden daha düşük olmasının anlamlı olduğunu ifade etmişlerdir. Buck JJ ve ark. (10) ise çalışmalarında KAH'li kadın ve erkeklerdeki bu oranı erkeklerde daha düşük bulmuşlardır. Daha önce yapılan çalışmalarda araştırmacıların daha çok yetişkin bireylerden ve el grafilerinden yararlandığı belirtilmektedir (8,11-13). Fetal döneme ait çalışmalar ise gebelik sırasında ultrason ile yapılan çalışmalardır (14,15). Bu çalışmalarda fetal döneme ait bilgiler 20. haftadan sonraki döneme ait bulgulardır. Yaptığımız literatür taramalarında; yeni doğanlara ait farklı gruplarda yapılmış ayrıntılı el ve parmak ölçümü ile ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Ayrıca daha önce yapılan çalışmalarda erken evrede intrauterin gelişim geriliğini tespit etmek, fetal ağırlığı yada gestasyonel yaşı belirlemek için parmak parametrelerinin önemli olduğu belirtilmektedir (2-6). Bu nedenle çalışmamızda yeni doğanlarda el ve 2-4 parmak morfometrik parametrelerine bakıldı. Bunlara ait daha detaylı bilgi verilerek el ve 2-4 parmak gelişiminin daha fazla tanımlanması ile yeni doğanlarda el ve parmak ile ilgili varyasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlandı. Ayrıca çalışmamızdaki verilerin yeni doğanlara ait malformasyon, anomali veya patolojilerin teşhis ve tedavisine katkıda bulunulabileceği düşünüldü.

## GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamızda prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığı dışında başka patoloji ve anomalisi olmayan yaşları 32-41 gebelik haftası yaşı arasında değişen Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesindeki 180 (90 erkek, 90 kız) olgudan yararlanıldı. Çalışma grubundaki olgularda ailelerinden izin alınarak el ve 2. 4. parmakların morfometrik değerleri araştırıldı. Yaşları 32-37 hf

arasındaki olgular prematüre 1.grup, 39-41 hf arasındaki olgular miadında 2.grup ve doğum kilosu 2500 gr altında olup yine yaşları 39-41 hf arasında olan olgular düşük doğum ağırlıklı 3.grup olarak değerlendirildi. Çalışmadaki olguların ebeveynleri çoğunlukla (%90) Konya ili ve çevresindeki bölgelerden oluşmaktaydı.

Çalışmada ekstremiteler, el ve parmak anomalisi veya patolojisi olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Olguların cins ve gruplara göre dağılımı Tablo 1 de görülmektedir. Çalışma grubundaki olgularda daha önce yapılan çalışmalarda sağ ile sol eldeki ölçümler arasında fark bulunmadığının belirtilmesi nedeniyle sadece sağ elden; el ve 2. 4. parmaklar ile ilgili 4 adet antropometrik ölçüm ve el ve parmaklar ile ilgili el ve 2/4 parmak indeks değerleri araştırıldı. Olgularda el ve 2. 4. parmaklar ile ilgili morfometrik boyutları belirlemek için kılavuzlu pergel, milimetrik cetvel ve plastik ölçü aletleri kullanıldı. Metrik çalışmada metot olarak daha önceki çalışmalarda kullanılan standart antropometrik noktalardan faydalanılarak aşağıda tanımlanan ölçümler alındı (16,17). El ve parmak indeksleri ise daha önceki çalışmalarda belirtilen yöntemlerle hesaplandı (5,13).

El uzunluğu; Distal de Radius ve Ulna kemiklerinin en dış kenarları proc. styloideus'ların uç noktaları arasındaki transvers eksen ile orta parmağın en uç noktası arasındaki vertikal mesafe.

El genişliği; 2. ve 5. metakarpofalangeal eklemler seviyesinde elin en dış kenarları arasındaki transvers mesafe.

İkinci parmak uzunluğu; 2. metakarpofalangeal eklemler ortası ile 2.parmağın distal ucu arasındaki mesafe.

Dördüncü parmak uzunluğu; 4. metakarpofalangeal eklemler ortası ile 4.parmağın distal ucu arasındaki mesafe.

El ve parmak ölçümlerden çıkarılan indeksler

2/4 parmak indeksi:  $\left[ \left( \frac{2. \text{ parmak uzunluğu}}{4. \text{ parmak uzunluğu}} \right) \times 100 \right]$

El indeksi:  $\left[ \left( \frac{\text{el genişliği}}{\text{el uzunluğu}} \right) \times 100 \right]$

SPSS istatistik programı kullanılarak alınan bütün verilerin cinslere, gruplara göre aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlendi. Cinsler arasındaki farklılık tespitinde "student t testi" kullanıldı. Gruplar arasındaki farklılık önce varyans analizi ile tespit edildi ve daha sonra farklılığın

**Tablo 1.** Olgulardan elde edilen parametrelerin cinslere ve gruplara göre aritmetik ortalama ve standart sapmaları.

Grup	Miadında yenidoğan (MYD)			Düşük doğum ağırlıklı yenidoğan (DYD)			Prematüre yenidoğan (PYD)			P
	Erkek n: 30	Kız n: 30	Erkek+kız n: 60	Erkek n: 30	Kız n: 30	Erkek+kız n: 60	Erkek n: 30	Kız n: 30	Erkek+kız n: 60	
Yaş (hf)	40±0	40±0	40±0	40±0	40±0	40±0	34±3	32±3	33±3*	bc
Kilo (gram)	3344±371	3460±299	3402±339	2238±210	2134±304	2186±264	2078±527	1796±499	1937±529*	abc
Boy (cm)	50±1	51±1	51±1	46±2	46±3	46±3	44±5	44±4	44±4	abc
El uzunluğu (mm)	61±3	61±4	61±4	56±4	54±3	55±4	53±4	49±5	51±5*	abc
El genişliği (mm)	35±2	37±2	36±2*	32±2	33±3	33±3	30±5	28±4	29±4	abc
2. parmak uzunluğu (mm)	37±2	38±2	38±2*	34±2	33±2	33±2	33±3	31±4	32±3*	abc
4. parmak uzunluğu (mm)	38±2	39±2	39±2φ	35±2	34±2	34±2φ	34±3	32±4	33±4*φ	abc
2-4 parmak indexi	96±3	98±2	97±3*	96±2	97±3	96±3	96±2	97±3	97±3	
El indexi	58±3	60±3	60±3*	58±3	61±4	59±4*	57±7	58±5	57±6	b

P: Aralarında farklılık bulunan gruplar (Varyans analizi, Tukey-B testi; p<0.05), karşılaştırılan gruplar, a: MYD - DYD, b: MYD - PYD, c: DYD - PYD

\* : p<0.05, cinsler arası farklılık:

φ : p<0.001: 2. ve 4. parmak uzunluklarının karşılaştırılmasındaki farklılık

hangi gruplar arasında olduğu Tukey-B testi (post hoc) kullanılarak belirlendi.

## BULGULAR

Her üç grupta da alınan bütün parametrelerin cinslere ve gruplara göre aritmetik ortalama ve standart sapmaları belirlendi (Tablo 1). Alınan el ve 2. 4. parmak parametreleri arasındaki korelasyon değerleri hesaplandı (Tablo 2,3,4). Her üç grupta da alınan morfometrik parametreler arasında müspet yönde korelasyon vardı. Ayrıca prematüre olgularda yaş ile bütün morfometrik değerler arasında da müspet yönde korelasyon mevcuttu (p<0.001, Tablo 4).

Çalışmada elde edilen verilerde cinsler arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı. El ve 2. 4. parmak ile ilgili alınan parametrelerde cinsler arasındaki farklılıklar Tablo 1 de görülmektedir. Cinsler arasındaki farklılıklar gruplara göre değişiyordu. Miadında yenidoğanlarda el genişliği ve 2. parmak uzunluğunda cinsler arasında anlamlı fark bulundu (p<0.001). Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda ise bütün parametrelerde cinsler

arasında fark yoktu. Prematüre grupta ise cinsler arasında boy ve el genişliği hariç bütün parametrelerde farklılık mevcuttu. Ancak prematüre grupta erkek ve kızların yaş ve kilo bakımından dengeli vakalardan seçilememesi bu sonucun dikkatle yorumlanması gerektiğini göstermektedir (Tablo 1).

Daha sonra 2. ile 4. parmak uzunluklarının karşılaştırılmasında bütün gruplarda farklılık olduğu tespit edildi. El ve parmak ölçümlerinden çıkarılan indekslerden 2/4 parmak indeksi ve el indeksi değerlendirilmesinde ise; miadında yenidoğanlarda her iki indekste de, düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda sadece el indeksinde cinsler arasında farklılık olduğu, prematüre grupta ise her iki indeks bakımından da cinsler arasında farklılık olmadığı belirlendi (Tablo 1).

Daha sonra elde edilen verilerin parametre değerlerinin gruplar arasında karşılaştırılmasında farklılık olup olmadığı araştırıldı (Tablo 1). Prematüre grupta yaş hariç bütün parametrelerde her üç grup arasında da farklılık tespit edildi (Tablo

**Tablo 2:** Miadında yenidoğan olgulardan alınan parametreler arasındaki korelasyon tablosu.

	Kilo	Boy	El uzunluğu	El genişliği	2. parmak uzunluğu	4. parmak uzunluğu	2-4 parmak oranı
Boy	76***						
El uzunluğu	46***	40**					
El genişliği	51***	34**	57***				
2. parmak uzunluğu	49***	33**	63***	68***			
4. parmak uzunluğu	45***	31*	72***	55***	87***		
2-4 parmak oranı	18	11	-1	36**	43***	-1	
El indexi	1	-1	-43***	50***	1	-15	44***

\*: p<0.05, \*\*: p<0.01, \*\*\*: p<0.001

**Tablo 3:** Düşük doğum ağırlıklı yenidoğan olgulardan alınan parametreler arasındaki korelasyon tablosu.

	Kilo	Boy	El uzunluğu	El genişliği	2. parmak uzunluğu	4. parmak uzunluğu	2-4 parmak oranı
Boy	82***						
El uzunluğu	62***	43***					
El genişliği	77***	62***	67				
2. parmak uzunluğu	59***	50***	67	67***			
4. parmak uzunluğu	59***	54***	69	66***	88***		
2-4 parmak oranı	4	-3	1	8	31*	-18	
El indexi	28*	31*	-30*	53***	9	5	10

\*: p<0.05, \*\*: p<0.01, \*\*\*: p<0.001

1). İndeks sonuçları bakımından ise 2/4 parmak indeksinde gruplar arası fark tespit edilmedi (p>0,05, Tablo 1). El indeksinde ise sadece miadında ile prematüre yenidoğanlar gruplar arasında farklılık olduğu tespit edildi (p<0,05, Tablo 1).

tanımlanmasında önemli ipuçları verir (18). Yenidoğanlarda fetal disgenezisin delillerinin gösterilmesinde anormal el ve 2/4 parmak uzunluklarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Konjenital Adrenal Hiperplazi, Asperger ve Down Sendromu ile el ve 2/4 parmak ölçümleri arasında bütün

**Tablo 4:** Prematüre yenidoğan olgulardan alınan parametreler arasındaki korelasyon tablosu.

	Yaş	Kilo	Boy	El uzunluğu	El genişliği	2. parmak uzunluğu	4. parmak uzunluğu	2-4 parmak oranı
Kilo	86***							
Boy	71***	78***						
El uzunluğu	74***	74***	63***					
El genişliği	70***	69***	68***	70***				
2. parmak uzunluğu	74***	74***	66***	88***	76***			
4. parmak uzunluğu	79***	79***	68***	88***	76***	97***		
2-4 parmak oranı	-46***	-39**	-24	-28*	-22	-19	-42***	
El indexi	32*	32*	37**	9	77***	29*	28*	-7

\*: p<0.05, \*\*: p<0.01, \*\*\*: p<0.001

## TARTIŞMA VE SONUÇ

El ve parmakların bölümleri ve şekli, fetal ve post-natal dönemde bireyin gelişim özelliklerini yansıtan önemli bir göstergedir. Bu yüzden araştırmacılar fetal ekstremitte gelişimi ile ilgili olarak bir çok ultrasonografi çalışmaları yapmışlardır (14,15). Bu çalışmalarda intrauterin fetal ekstremitte gelişimini, fetal ağırlığı yada gestasyonel yaşı belirlemeyi amaçlamışlardır. Bazı çalışmalarda ise kemik gelişimi ile hormonlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymuşlar ve bazı hastalıkların belirleyicisi olarak göstermişlerdir (4-6,9). Yeni doğanlarda el ve 2/4 parmak gelişimi ile ilgili bilgiler diğer fetal biometrik parametrelerle karşılaştırıldığında malformasyon sendromlarının belirlenmesinde veya tanımlanmasında yalnız başına yetmez. Ama prematüre ve yenidoğan bebeklerde kesin patolojik proseslerin daha iyi

olgularda anlamlı ilişkiler bulunmuştur (5,8,10,18).

İntrauterin dönemde yapılan çalışmalarda; her iki el uzunluk parametrelerinin Crown Rump Length (CRL) ile uyumlu olduğunu belirtmişler ve el ile ilgili parametrelerin genel fetal gelişiminin iyi bir belirleyicisi olduğunu vurgulamışlardır (8). Ayrıca fetal dönemde daha önce yapılan çalışmalarda alınan ölçümlerde cinsler arasında bir fark bulunmamıştır (16). Ayrıca Manning JT ve ark. (5), Asperger Sendromlu ve otizmlili çocuklarda yaptıkları çalışmalarda 2.parmak/4.parmak oranlarını populasyonun normal değerlerinden daha düşük olarak bulmuştur. Çalışmamızda yenidoğanlarda el ve 2. 4. parmak ile ilgili ölçümler yapılmıştır. Bulunan sonuçların gruplara ve cinslere göre ortalamaları ve standart sapmaları alınıp karşılaştırılmıştır. Bu nedenle çalışmamızda elde edilen veriler yenidoğanların gelişiminin

değerlendirilmesinde yararlı olabilir.

Ökten A ve ark. (13), yenidoğan ve çocukların sağ ve sol el filmleri ve fotokopilerini çekmişler ve 2. ve 4. parmak uzunluğunu, metacarpal ve phalanx uzunluğunu ölçmüşlerdir. 21-hidroksilaz eksikliği olan çocuklarda 2.parmak/4.parmak oranının düşük olmasını testosteron ve östrojenin prenatal seviyeleri ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Manning JT. ve ark. (4), ise çocuklarda 2. ve 4. parmak uzunluklarını ölçmüşler, sağ elde yüksek bulunan 2.parmak/4.parmak oranının erkeklerde germ hücre yetmezliği ile ilgili olabileceğini belirtmektedirler. 2.parmak/4.parmak oranı sağ elde sperm sayısı ile negatif, östrojen ve luteinleştirici hormon ile pozitif, erkeklerde testosteron konsantrasyonu ile negatif, hem erkek hem de kadınlarda luteinleştirici hormon, östrojen ve prolaktin konsantrasyonu ile pozitif ilişkili olarak bulunmuştur. Yenidoğan ve çocuklarda bulunan parmak uzunlukları ile hormonlar arasındaki bu ilişkinin bir çok hastalığın tanımlanmasında yararlı olabileceğini belirtmektedirler (4-6,19,20). Çalışmamızda farklı yenidoğan gruplarına ait bulunan el ve parmak parametrelerinin yenidoğan döneminde hormonal denge ile el ve el parmakları arasındaki ilişkiler ile ilgili yapılacak çalışmalar için bir kaynak teşkil edeceğini düşünmekteyiz.

Erişkinlerde yapılan çalışmalarda (20-22), erkek ve kadınların 2. ve 4. parmak uzunluklarının arasındaki farkı ortaya çıkarmışlardır. Erkeklerin çoğunda yüzük parmağının boyutu, işaret parmağının boyutundan büyük bulunmuştur. Ayrıca erişkinlerde insan parmak uzunluk oranları örnekleri ile cinsiyet farklılıklarının tespit edilebileceğini vurgulamışlardır (9). Ayrıca Manning JT. ve ark. (4), da erkek ve kadınlarda 2. ve 4. parmak uzunluklarını ölçmüşler ve bunların testosteron ve östrojen seviyeleri ile ilişkilerine bakmışlardır. Bulunan oranlar testosteron ve sperm sayısı ile negatif, östrojen konsantrasyonu ile pozitif ilişkilidir. Ayrıca 2.parmak/4.parmak oranının Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH), Asperger ve Down Sendromu gibi bazı hastalıkların belirleyicisi olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda yenidoğanlarda 2. ile 4. parmak uzunluk parametrelerinin cinsler arasında karşılaştırılmasında; 2. parmakta kızlarda 4. paraktan daha uzun olabileceğine ilişkin herhangi bir farklılığa rastlanmadı. Ancak 2/4 parmak indeksindeki oranın kızlarda 2. parmak uzunluğu

lehine daha fazla oluşu 2. parmağın kızlarda erkeklere göre daha uzun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle cinsler arasındaki 2.parmak ile 4. parmak uzunlukları oranlarının tamamen yenidoğan döneminde de oluşmadığı, Ökten A ve ark. (13), ile Manning JT. ve ark. (5,6,19,20)'nın yaptığı çalışmalarda belirttikleri gibi bu oranın daha sonraki çocukluk dönemi sürecinde oluştuğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızdan elde edilen verilerin, bulduğumuz sonuca göre parmak oranlarının prenatal ve postnatal yenidoğan döneminde daha fazla oranda büyümeye başladığı daha sonraki süt çocukluğu ve ileriki çocukluk dönemlerinde bu oranın şekillendiği görüşüne destek açısından kıymetli olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca çalışmamızda bulmuş olduğumuz parametrelerin yenidoğanlarda gelişimin değerlendirilmesinde endokrin hastalıklarının daha erken evrede teşhisinde faydalı olacağına inanmaktayız.

Çalışmamızda farklı yenidoğan gruplarında el ve 2/4 parmak ile ilgili belirlenen morfometrik parametreler daha önceki çalışmalarda belirtilmeyen ayrıntılı detaylar içermektedir. Bu nedenle çalışmamızda belirlenen parametrelerin yenidoğanların değerlendirilmesinde, patoloji ve anomalilerin erken teşhisinde yararlı olacağı kanaatindeyiz. Özellikle 2/4 parmak uzunluğu ve indeks parametrelerinin yenidoğan dönemde cinsler arasında farklılık göstermesi ile ilgili elde ettiğimiz veriler; daha sonraki yapılacak çalışmalar için öncü bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. Çalışmamızda elde edilen verilerin el ve 2/4 parmaklar ile ilgili anomali, patoloji ve varyasyonların belirlenmesinde obstetri, perinatoloji, adli tıp ve fetopatoloji gibi bilim dallarındaki çalışmalara, teşhis ve tedavilere katkıda bulunacağını ummaktayız.

## KAYNAKLAR

1. Moore KL, Persaud TVN. The developing human clinically oriented embryology. Çeviri: Yıldırım M, Okan I, Dalcık H.(Ed.). Nobel Tıp Kitapevleri. İstanbul 2002; 6. Baskı:405-50.
2. Sadler TW. Langman's medical embryologic. Williams&Wilkins. Çeviri: Başaklar AC. (Ed.). Palme Yayıncılık. Ankara 1996; 7. Baskı:140-57.
3. Robinson SJ, Manning JT. Ratio of 2nd to 4th digit length and male homosexuality. *Evol Hum Behav* 2000; 21(5):333-45.
4. Manning JT, Scutt D, Wilson J, Lewis-Jones DI. The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of testosterone, luteinizing hormone and oestrogen. *Hum Reprod* 1998; 13(11):3000-4.
5. Manning JT, Baron-Cohen S, Wheelwright S, Sanders G. The 2nd to 4th digit ratio and autism. *Dev Med Child Neurol* 2001; 43(3):160-4.
6. Manning JT, Henzi P, Bundred PE. The ratio of 2nd to 4th digit length: a proxy for testosterone, and susceptibility to hiv and aids?. *Med Hypotheses* 2001; 57(6):761-3.
7. Firman RC, Simmons LW, Cummins JM, Matson PL. Are body fluctuating asymmetry and the ratio of 2nd to 4th digit length reliable predictors of semen quality? *Am J Obstet Gynecol* 2003; 18(4):808-12.
8. Kjaer MS, Keeling JW, Andersen E, Fischer Hansen B, Kjaer I. Hand development in Trisomy 21. *Am J Med Genet* 1998; 12;79(5):337-42.
9. Brown WM, Hines M, Fane BA, Breedlouw SM. Masculinized finger length patterns in human males and females with congenital adrenal hyperplasia. *Horm Behav* 2002; 42(4):380-6.
10. Buck JJ, Williams RM, Hughes IA, Acerini CL. In-utero androgen exposure and 2nd to 4th digit length ratio-comparisons between healthy controls and females with classical congenital adrenal hyperplasia. *Hum Reprod* 2003; 18(4):976-9.
11. Aydınlioğlu A, Akpınar F, Tosun N. Mathematical relations between the lengths of the metacarpal bones phalanges: surgical significance. *Tohoku J Exp Med* 1998; 185(3):209-16.
12. Lewis S. Morphological aspects of male and female hands. *Ann Hum Biol* 1996; 23(6):491-4.
13. Ökten A, Kalyoncu M, Yarı M. The ratio of second-and fourth-digit and congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. *Early Hum Dev* 2002; 70(1-2):47-54.
14. Brons JTJ, van Geinjn HP, Bezemer PD, Nauta JPJ, Arts NfTh. The fetal skeleton; ultrasonographic evaluation of the normal growth. *Eur J Obstet Gynecol and Reprod Biol* 1990; 34(1-2):21-36.
15. Budarick NE, Pretorius DH, Johnson DD, Tartal MK, Lou KU, Nelson TR. Three-dimensional ultrasound examination of the fetal hands: normal and abnormal. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1998; 12(4):227-34.
16. Doğan Ş. Fetal dönemde el ve ayak gelişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi (Tıp-Anatomi), Isparta 2004. 1-52.
17. Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Osteology. *Gray's Anatomy* (38th Ed) London: Churchill Livingstone Medical Division of Longman UK; 1995:p.393-8.
18. Taeusch HW, Ballard RA, Avery ME. Diseases of The Newborn. In: Taeusch HW. Initial evaluations: History and physical examination of the newborn. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1991; pp: 207-24.
19. Manning JT, Bundred PE. The ratio of 2nd to 4th digit length; a new predictor of disease predisposition?. *Med Hypotheses* 2003; 54(5):855-7.
20. Manning JT, Bundred PE, Flanagan BF. The ratio of 2nd to 4th digit length: a proxy for trans activation activity of the androgen receptor gene?. *Med Hypotheses* 2002; 59(3):334-6.
21. Peters M, Mackenzire K, Bryden P. Finger length and distal finger extent patterns in humans. *Am J Phys Anthropol* 2002; 117(3):209-17.
22. Kulaksız G. El dominansının, el antropometrik ölçümleri üzerine etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. Ankara 2001; 1-24.

# Alveol yarıklı hastaların operasyon öncesi ve sonrası dönemde periapikal ve oklüzal grafi ile değerlendirilmesi

Zekeriya TOSUN, Adem ÖZKAN, Mustafa KESKİN, Nedim SAVACI

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD.,KONYA

## ÖZET

**Amaç:** Bu çalışmanın amacı, alveol yarıklarının takibinde sık kullanılan pahalı ve radyasyon dozu yüksek olan bilgisayarlı tomografi (BT) yerine daha ucuz ve daha az radyasyon veren görüntüleme yöntemleri kullanmaktır. Bunun için diş hekimleri tarafından dental patolojilerin tanısında sık kullanılan periapikal ve oklüzal grafi kullanıldı. **Hastalar ve metod:** 1998 - 2004 yılları arasında "tek taraflı alveol yarığı" olan 11 hasta otojen iliak ve allojenik kansellöz kemik grefti ile opere edilmiştir. Preoperatif kemik defektler periapikal ve oklüzal grafiler çekilerek NetCAD programı ile belirlendi. Peroperatif kemik mumu ile yeniden defekt ölçümü yapılarak gerçek değer bulundu. Postoperatif 6 ay-1 yıl süresinde aynı grafilerle geç kontrol filmleri alındı ve kemik kaybı yüzde (%) olarak ve etraf dokularla olan ossifikasyonu değerlendirildi. **Sonuç:** Uygulamanın kolay olması, özellikle çocukların daha az radyasyon almaları ve ekonomik olması nedeniyle alveol yarıklarının takibinde BT yerine periapikal ve oklüzal grafi kullanılabileceği kanaatindeyiz.

**Anahtar kelimeler:** Alveol yarığı, periapikal grafi, oklüzal grafi

Selçuk Tıp Derg 2005; 21:11-16

## SUMMARY

**Determination of patients with alveol clefts by periapical and oclusal graphies at pre operative and post operative period.**

**Objective:** Purpose of this study was to use imaging methods which is cheaper and offering less radiation dousage instead of Computarized Tomography (CT) which is more expensive and higher radiation dousage for determination of alveol clefts. For this purpose,perapical and oclusal plane X-rays are used in this study, which are widely used by dentists for diagnosis of dental pathologies. **Patients and Methods:** Eleven patients with unilateral alveol clefts was operated with seconder otogen iliac and allogenic cansellous bone grafts between 1998 and 2004. Bone defects was measured by NetCAD program with periapical and oclusal graphies pre operatively. Bone wax was used for per operative measurement and real size has been obtained. Late period control graphies was obtained with the same rontgenograms between post operative 6 months and 1 year. Lost bone volume and ossification were determined. **Result:** We think that periapical and oclusal graphies are easier procedures and may be used instead of CT for follow up in alveol clefts. Addditional advantages are exposure to lower doses of radiation and low prices.

**Key words:** Alveol cleft, periapical X-Ray, oclusal X-Ray

Fonksiyonel olduğu kadar estetik olarak da önemli bir problem olan alveol yarıklarının tanı ve takibinde uygun yöntemlerin kullanılması önemlidir. Alveol yarıklarında kemik greft ile onarım yarıklı dudak damaklı hastaların temel tedavi şekillerindedir.

Erken dönemde kemik greftle onarıma primer alveolar greftleme denirken geç dönemde (5-7 yaş) yapılan onarıma ise sekonder alveolar greftleme denmektedir (1).

Kalıcı üst kanin dişlerin sürmesinden önce, 6-12 yaş arasında greftleme yapılması önerilmektedir.

Kemik greft dişlerin sağlam olmasını ve ortodontik yönlendirmenin kolay olmasını sağlamaktadır. Alveol yarıklarında sekonder greftleme fikri Boyne ve Sands'e (1972) aittir (2).

Alveol yarıklarının primer alveolar greftleme yöntemi ile onarımının maksillanın büyümesini inhibe ettiği ve kemik greftin dişlere yeterli desteği sağlayamayacak kadar rezorbe olduğu bildirilmektedir (1). Kanin dişler sekonder greftlenmiş alveolar yarığa doğru yeterince sürmektedir (3). Bu nedenle olgularımıza sekonder alveolar greftleme yapılmıştır.

Haberleşme Adresi: Dr. Zekeriya TOSUN

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi  
A.D.,KONYA

e-posta: ztosun@selcuk.edu.tr

Geliş Tarihi : 17.2.2005

Yayına Kabul Tarihi : 22.3.2005

Kemik greftleme ile,

1-Maksilla segmentlerinin stabilizasyonu ve alveolar kemik kontur devamlılığının sağlanması,

2-Oronasal fistüllerin kapatılması,

3-Bitişik dişlere kemik destek sağlanması,

4- Dişlerin ortodontik hareketine izin verilmesi,

5-Büyüme ve gelişme bozukluğunu azaltılması,

6-Burun tabanına ve dudağa destek sağlamak amaçlanmaktadır (4).

Kemik greftiyle onarım yapılan hastaların tanı ve takiplerinde radyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, alveol yarıklarının tanı ve takibinde, uygulanabilirliği kolay ve ekonomik olarak da daha ucuz teknikler olan periapikal ve oklüzal grafi kullanımı konusundaki deneyimlerimiz sunulmuştur.

Oral beslenmeye postoperatif 48. saatte başlandı. Postoperatif takip süremiz 4.5 yıl ile 9 ay arasında olup ortalama 2.5 yıl idi.

Hastalarımıza preoperatif periapikal (Kodak Ultraspeed Dental Film Ref Cat: 1874940 Lot: 2103870) ve oklüzal grafi (Kodak Ultraspeed Dental Film Ref Cat :1666163 Lot: 2104160) çekilerek postoperatif dönemde (en erken 6 ay, en geç 1 yıl içerisinde) aynı grafiyle takipleri yapıldı. Preoperatif çekilen grafi dijital ortama aktararak ihtiyaç duyduğumuz kemik greft miktarı NetCAD programı ile tespit edildi. Söz konusu defektin gerçek hacmi peroperatif defektin kemik mumu ile doldurulmasıyla yeniden ölçüldü ve preoperatif değerlerle karşılaştırıldı (Tablo 1).

## TARTIŞMA

Alveol yarıklarında kemik grefti ile onarım geniş kabul görmüş bir yöntem olup bunun için öne-

**Tablo 1.** Hastalara ait temel özellikler.

Hasta no	Yaş	Kullanılan kemik	Ortalama defekt hacmi (cm <sup>3</sup> )		Geç postop (6 ay-1 yıl) (cm <sup>3</sup> )	Volüm kaybı (%)	Komplikasyon
			Pre-op	(kemik mumu ile)			
1	8,3	otojen	1,83	1,92	1,80	6,25	Yok
2	8	otojen	1,76	1,79	1,71	5	Yok
3	6,9	otojen	2,05	2,12	1,98	6,7	Rezorbsiyon
4	6,8	otojen	1,49	1,56	1,35	14	Rezorbsiyon
5	7,8	allojen	2,78	2,89	2,61	10	Yok
6	9,7	allojen	1,98	2,08	1,80	13,5	Yok
7	8,9	allojen	2,01	2,12	1,83	3,7	Yok
8	8,6	allojen	2,45	2,49	2,01	20	Yok
9	8,7	allojen	2,98	3,08	2,89	7	Yok
10	9,8	allojen	2,92	2,9	2,53	16	Yok
11	12,2	allojen	3,12	3,18	2,48	23	Yok

## GEREÇ VE YÖNTEM

1998 - 2004 yılları arasında "tek taraflı alveol yarığı" nedeni ile 11 hasta opere edildi ve otojen iliak ve allojenik kansellöz kemik greft ile onarıldı. Hastalarımız 6-12 yaş arasında olup ortalama yaş 8.7 di. Altı hasta sol, 5 hasta sağ "alveol yarığı" ile başvurdu, bunlardan dördüne tek korteksli kansellöz krista iliakadan alınan otojen; yedisine de allojen kemik grefti (TUTOPLAST, Tutogen Medical, Germany) konularak mukozal fleplerle kemik doku örtüldü. Tüm operasyonlar genel anestezi altında yapıldı. Müdahale öncesi % 0.5' lik lidokain ( 1/100.000 adrenalini ) ile lokal anestezi yapıldı. Postoperatif intravenöz antibiyoterapi başlandı ve 5-6 gün devam edildi. Bu süre içerisinde klorheksidin ile ağız gargarası yapıldı.

rilen zaman kalıcı üst kanin dişlerin sürmesinden öncedir. Bu süre genellikle 6-12 yaş arasındadır. Bu hattan çıkan dişler yarık nedeniyle yeterli desteğe sahip olmadıklarından deplase olmaya eğilimlidirler. Kemik grefti ile elde edilen destek bu dişlerin sağlam olmasını ve ortodontik müdahalelerle yönlendirilebilir olmasını sağlamaktadır (2).

Kemik grefti uygulanmış hastaların sonuçlarının radyolojik yöntemle takibi gerekmektedir. Bunun için panoramik grafi önerilmekte ise de bu grafide üç boyutlu değerlendirme zor olmakta ve bu grafi ile yüz orta hat bölgesinin iyi görüntülenemediği bilinmektedir. Alveol yarık bölgesi de aynı lokalizasyonda olduğundan panoramik grafinin bu amaçla kullanılması uygun değildir (5).



Bilgisayarlı tomografi (BT), hastaların tanı ve takibinde oldukça iyi bir alternatif olmasına rağmen alınan radyasyon dozu direkt grafilere oranla daha fazladır. Standart BT başlığı ile ortalama radyasyon dozu 34-55 mGy arasında değişmektedir. Maksillofasial bölgenin BT ile incelemelerinde ortalama kemik iliği radyasyon dozunun 17-21 mGy olduğu düşünülürse verilen radyasyonun ne kadar yüksek doz olduğu anlaşılabilir (6, 7). Bu rakamlar sıklıkla kullanılan 8 mm aralıkla 14 aksiyel kesit alınması halinde geçerlidir. Kesitlerin yetersiz görülmesi durumunda alınacak ilave görüntülerle bu doz daha da artacaktır. Periapikal ve oklüzal grafi için verilen radyasyon dozu 7 mGy kadardır (8). Alveol yarığı nedeni ile opere edilen hastaların çocuklar olduğu ve bizim hastalarımızın da 5-12 yaş arasında olduğu düşünülürse düşük dozda radyasyon almasının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Üç boyutlu tomografi klinisyenlere daha büyük kolaylıklar getirmekte ancak direkt grafilerle karşılaştırıldığında zaten yüksek olan BT maliyetini üç boyutlu çekerek daha da artırmaktadırlar. Üstelik üç boyutlu tomografi, radyasyon dozu açısından daha düşük bir doz değildir (8).

Periapikal grafi dental patolojilerde ve özellikle dişlerin "apex" bölgesi dikey yönde görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Oklüzal grafi ise maksilla ve mandibula ile dişlerin yatay yöndeki görüntülerini verir. Periapikal grafi ile daha çok greft yükseklığı doğru olarak belirlenebilirken transvers planda kemik büyüklüğünün değerlendirilmesi ise oklüzal grafi ile olmaktadır (9). Çalışmamızda her iki grafinin de kullanılmış olması ölçüm ve değerlendirmede daha kesin veriler elde etmemizi sağlamıştır. Periapikal inflamatuvar hastalıkların tanısında periapikal radyografinin doğruluk oranı, duyarlılığı ve spesifitesinin tayini için 140 hasta ile yapılan çalışmada, doğruluk oranı ortalama %70.2, duyarlılığı 0.65, spesifitesi 0.78 olarak bulunmuştur. Periapikal grafinin bu bölge için spesifitesi oldukça yüksektir (10).

Üç boyutlu tomografi daha çok kemik defektinin tam rakamsal olarak tespiti için kullanılmaktadır. Bu rakam çeşitli araştırmacılar tarafından  $0.9 \text{ cm}^3$  ile  $3.6 \text{ cm}^3$  arasında bulunmuş olup ortalama hacim  $1.5 \text{ cm}^3$  ile  $2.1 \text{ cm}^3$  arasında verilmiştir (11, 12). Ameliyat sırasında öncelikle alveolar yarıklarının açıldığı ve hazırlandığı düşünülürse net rakam operasyon sırasında zaten öğrenilmektedir. Bunun için kemik mumu gibi ameliyathane şartlarında kolay bulunabilecek bir materyal kullanılabilir.

dir (12). Bu ölçüm daima en gerçekçi sonucu verecektir. Olgularımızda peroperatif kemik mumu ölçümleriyle preoperatif ölçümler karşılaştırıldığında oldukça yakın sonuçlar elde edilmiştir. Preoperatif periapikal ve oklüzal grafiler dijital ortama aktarılarak NetCAD programı ile yarık hattı için gereken kemik doku miktarı hesaplanmıştır (Şekil 1A-G, 2A-D). Böylece BT'nin kemik greft hacmini preoperatif belirlemek için şart olduğu düşüncesinin de geçerliliğini yitirdiğini düşünüyoruz.



Şekil 1a. Hasta No: 6 Oklüzal grafi ile yarık alanının görünümü.



Şekil 1b. NetCAD programı ile defektin büyüklüğü tespit ediliyor.



Şekil 1c. Defektin boyutları aynı program ile ölçülmektedir.

Ortalama yarık genişliği 6.4 mm (3-12mm) olan 53 tek taraflı alveol yarığı olan hastada postoperatif bir yıl sonra kemik miktarının ortalama % 35'nin rezorbe olduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada yarık genişliği arttıkça greft rezorpsiyonunun da arttığı bulunmuştur. Bu, greft merkezinin revaskülarizasyonunun genişlikten dolayı yetersiz kalması, yeterince kemik konulamaması, gingivamukozal fleplerin kollapsına bağlı stabilite kaybı veya greft



Şekil 1d. Post operatif 8 ay sonra çekilen oklüzal grafi.



Şekil 1e. Aynı hastanın periapikal grafi ile yarık alanının görünümü.


ekspozisyonuna bağlı olabilir. Rezorpsiyon görülen olguların erken postop beslenmeye bağlı flep 'dehiscens' nedeniyle olduğu düşünülmüştür. Geniş volüm kaybı olan olgular ise yaşça büyük ve buna bağlı geniş alveolar yarığı olan olgulardır. Yaşça büyük olanlarda kalıcı kanin dişin sürmüş olması da greft kaybının sorumlularından sayılmıştır (13). Bizim olgularımızda bu oranda greft kaybı olmamış, en fazla greft kaybı olan 8 ve 11 no'lu olgular ise belirtildiği gibi yaşça büyük ve geniş defekte sahip hastalardır.



Şekil 1f. NetCAD programı ile defektin büyüklüğü tespit edilmektedir.




Şekil 1g. Post operatif 8 ay sonra çekilen periapikal grafi ile yeterli ossifikasyon görülmektedir.



Şekil 2a. 2 nolu hastada oklüzal grafi ile yarık alanının görünümü.



Şekil 2b. 6 ay sonra çekilmiş kontrol grafisi.



Şekil 2c. Aynı hastanın yarık alanının periapikal grafi ile görünümü.

Başarılı alveol yarık tamiri kriterleri olarak: Oronasal fistülün kapatılması, kemik devamlılığının ve ark stabilitesinin sağlanmış olması, kortikal veya kanselloz kemik varlığı, lateral incisor ve kanin diş retansiyonu, klinik olarak şikayet olmaması, inflamasyonsuz gingivaya yapışık greft şeklinde sıralanmaktadır (14, 15). Olgularımız bu anlamda periapikal ve oklüzal grafiyle değerlendirilirken pedodonti uzmanınca da yarık hattının



Şekil 2d. 6 ay sonraki kontrol filmi

yanlarındaki kanin ve incisor dişler izlenmiştir. Bu kriterler göz önüne alındığında postoperatif sonuçlar başarılı kabul edilmiştir.

Komple kemik greft yetersizliği, oronasal fistülün tekrarlaması ve lokal yara enfeksiyonu bu operasyonların major komplikasyonları iken; yara 'dehiscensî', kemik greftin parsiyel kaybı ve otojen greft alınanlarda donör alan morbiditesi minor komplikasyon olarak bildirilmiştir (14, 16). Olgularımızda major komplikasyon görülmedi. Rezorpsiyon görülen iki hasta yeniden opere edildi ve ikinci operasyon sonrası komplikasyon görülmedi.

### KAYNAKLAR

1. Tai CC, Sutherland IS, McFadden L. Prospective analysis of secondary alveolar bone grafting using computed tomography. *J Oral Maxillofac Surg* 2000;58:1241-9.
2. Boyne PJ, Sands NR. Secondary bone grafting of residual alveolar and palatal clefts *J Oral Surg* 1972;30:87-91.
3. Hogan L, Shand JM, Heggie AA, Kilpatrick N. Canine eruption into grafted alveolar clefts: a retrospective study. *Aust Dent J*. 2003;48:119-24.
4. Robertson NR, Jolleys A. An 11-year follow-up of the effects of early bone grafting in infants born with complete clefts of the lip and palate. *Br J Plast Surg* 1983;36:438-43.
5. McCarthy JG, Cutting CB. Sekondary deformities of cleft lip and palate. In Georgiade GS, Georgiade NG, Riefkohl R, Barwick WJ. *Textbook of Plastic, Maxillofacial and Reconstructive Surgery*. Maryland, USA: Williams &Wilkins; 1992: 312.
6. Christiansen EL, Moore RJ, Thompson JR, Hasso AN, Hinshaw DB Jr. Radiation dose in radiography, CT, and arthrography of the temporomandibular joint. *AJR* 1987;148:107-9.
7. Conway BJ, McCrohan JL, Antonsen RG, Rueter FG, Slayton RJ, Suleiman OH. Average radiation dose in standard CT examinations of the head: results of the 1990 NEXT survey. *Radiology* 1992;184:135-40.
8. Bradrick JP, Smith AS, Ohman JC, Indresano AT. Estimation of maxillary alveolar cleft volume by three-dimensional CT. *J Comput Assist Tomogr* 1990;14: 994-6.
9. Bayırlı G. Röntgen ışınları ve dişhekimliğinde uygulamalar. İstanbul: İ.Ü. Dişhek Fak. Yayınları;1994; 85-183.
10. Richard NB. The sensitivity, specificity, and reliability of radiographic periapical diagnosis of posterior teeth. *Oral surg oral med oral pathol* 2000;89:639-42.
11. Boyne PJ, Christiansen EL, Thompson JR. Advanced imaging of osseous maxillary clefts. *Radiol Clin North Am* 1993;31:195-207.
12. Botel U, Fleiner B, Steckeler S. Harvesting iliac crest bone spans in 172 maxillary cleft repairs: a retrospective study. *Fortschr Kiefer Gesichtschir* 1993;38:123-5.
13. van der Meij AW, Baart JA, Prah Andersen B, Kostense PJ, van der Sijp JR, Tuinzing DB. Outcome of bone grafting in relation to cleft width in unilateral cleft lip and palate patients. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2003;96:19-25.
14. Troxell JB, Fonseca RJ, Osbon DB. A retrospective study of alveolar cleft grafting. *J Oral Maxillofac Surg* 1982;40:721-5.
15. Bertz JE. Bone grafting of alveolar clefts. *J Oral Surg* 1981;39:874-7.
16. Thaller SR, Patel M, Zimmerman T, Feldman M. Percutaneous iliac bone grafting of secondary alveolar clefts. *J Craniofac Surg* 1991;2:135-9.

### SONUÇ

Periapikal ve oklüzal grafinin çekilmesinin kolay olması, postoperatif sık takibe imkan vermesi, düşük doz radyasyon içermesi ve daha ekonomik olması sebebiyle alveol yarığı olan hastaların tanı ve takibinde iyi bir seçenek olduğu kanaatindeyiz.

# Sol ana koroner arter oklüzyonu nedeni ile acil açık kalp cerrahisi uygulanan hastalardaki erken ve orta dönem sonuçlarımız

Niyazi GÖRMÜŞ, Kadir DURGUT, Atilla ORHAN, Tahir YÜKSEK, Hasan SOLAK

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, KONYA

## ÖZET

Sol ana koroner arterin darlıkları (LMCA) (>%50); sol ventrikül (LV) disfonksiyonu yapan, mortalite ve morbiditeyi artıran ciddi lezyonlardır. Bu lezyonlarda son yapılan araştırmalar cerrahi tedavinin medikal tedaviye üstün olduğunu göstermektedir. LMCA oklüzyonu nedeni ile kliniğimizde acil koroner bypass uygulanan hastalardaki erken ve orta dönem sonuçlar retrospektif olarak incelendi. Kliniğimizde 2003-2004'te önemli LMCA stenozu olan 21 hasta acil şartlarda opere edildi. Bu hastalardaki mortalite ve morbidite oranları kabul edilebilir seviyede bulundu. LMCA oklüzyonunda acil cerrahi revaskülarizasyon oldukça güvenilir ve hayat kurtarıcı bir yöntem olarak tercih edilmelidir.

**Anahtar kelimeler:** Sol ana koroner arter tıkanıklığı, açık kalp cerrahisi, koroner bypass

Selçuk Tıp Derg 2005; 21:17-20

## SUMMARY

**Early and mid-term results of urgent open heart surgery in patients with left main coronary artery disease**

Stenoses of the left main coronary artery are considered as significant lesions that cause left ventricular dysfunction and increase mortality and morbidity rates. It has been demonstrated that surgical treatment is better than medical treatment in these lesions. The early and mid-term results of patients to whom urgent coronary artery bypass surgery performed because of significant stenosis of left main coronary artery, were investigated retrospectively. Between 2003 and 2004, 21 patients were operated urgently in our department. The mortality and morbidity rates in these patients were found in acceptable ratios. Urgent surgical revascularization in left main coronary artery stenosis is a safe method and can be preferred as a life saving treatment in such cases.

**Key words:** Left main coronary artery stenosis, open heart surgery, coronary bypass

Sol ventrikülün büyük kısmı sol ana koroner arterden kanlanır. LMCA'nın önemli darlıkları (>%50); LV'yi etkiler, mortalite ve morbiditeyi artırır. Bu olguların çoğunda diğer koronerlerde de çoklu lezyonlar vardır (1). LMCA lezyonları koroner bypass geçirenlerin %10-15'ini oluşturur. Bazı yazarlar LMCA lezyonunun bir risk faktörü olduğunu savunurken (2,3), bazıları da ilave bir risk faktörü olmadığını savunmaktadır (4). Bunların yarısında stabil olmayan angina pectoris, miyokard infarktüsü ve %10'unda LV disfonksiyonu görülmektedir (2). Bunlarda cerrahi tedavi medikal tedaviye üstündür (3,5-7) ve acil cerrahi girişim yaşam kalitesini ve süresini artırır (8), sadece medikal tedavi ile takip edilen olgularda, ilk haftalarda yüksek oranda morbidite ve mortalite gelişmektedir (3,9). Yine de acil operasyonun gerekliliği tartışılmaktadır (10). Bu çalışmada, LMCA oklüzyonu nedeni ile acil koroner bypass uygulanan hastalardaki erken ve orta dönem sonuçlar retrospektif olarak incelendi.

## GEREÇ ve YÖNTEM

Kliniğimizde 2003-2004'te 304 koroner bypass cerrahisi uygulandı. Bunlardan %50 veya daha fazla LMCA stenozu olan 21 hasta acil açık kalp ameliyatı şartlarında opere edildi (Şekil 1).

LMCA darlıklı olgularda diğer koroner arterlerde de çeşitli oranlarda darlıklar vardı. Olguların hiçbirinde karotis arteri üzerinde üfürüm saptanmadı, ancak acil şartlarda opere edildiklerinden rutin doppler ultrasonografi incelemesi mümkün olmadı. Olgulara ilk 20 dakika için antegrad izotermik kan kardiyoplejisi verildi ve hemen tamamında safen ven grefti kullanıldığından krosklemp süresince uygulanan diğer kardiyoplejiler safen konduitletlerin proksimalinden verildi, kardiyopulmoner bypass sonlandırılırken hot-shot kan kardiyoplejisi uygulandı. Distal ve proksimal anastomozlar yapılırken tek aortik klemp tekniği tüm olgularda tercih edildi. Olguların 19'unda sol


Haberleşme Adresi: Dr. Niyazi GÖRMÜŞ,

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi  
Anabilim Dalı, KONYA

e-posta: ngormus@selcuk.edu.tr

Geliş Tarihi : 21.2.2005

Yayına Kabul Tarihi : 26.4.2005



Şekil 1: Ciddi LMCA oklüzyonunun (>%50) anjiyografik görüntüsü.

internal torasik arter (İTA) kullanıldı, 2'sinde sol İTA proksimalindeki stenoz nedeni ile kullanılmadı. Sadece 1 olguda diğer konduıtlere (İTA, safen ven grefti) ilaveten radial arter grefti ve sağ İTA kullanıldı. Greftlerin olgulara göre dağılımı Tablo 1'de

Tablo 1: Kullanılan greftlerin dağılımı.

Greft	Hasta Sayısı	Anastomoz Yeri
Sol İTA	19	LAD (18); LADD1 (1)
Sağ İTA	1	LAD (1)
Radial Arter	1	CxOM2 (1)
Safen Ven	21	Çeşitli

Tablo 2: Olgulara göre anastomoz sayıları.

Yapılan İşlem	Anastomoz Sayısı
Tek koronere bypass greftlemesi	0
İki koronere bypass greftlemesi	7
Üç koronere bypass greftlemesi	8
Dört koronere bypass greftlemesi	5
Beş veya çok koronere bypass greftlemesi	1

gösterilmiştir. Olguların anastomoz sayıları da Tablo 2'de görülmektedir.

Olgularda yaş, anastomoz sayısı, aort oküzyon süreleri (AOS) ile total pompa süreleri (TPS) arasındaki ilişkilerin istatistiksel önemi araştırıldı.

## SONUÇLAR

Postoperatif dönemde en sık olarak atrial fibrilasyon ile karşılaşıldı. Olguların % 80'inde atrial fibrilasyon gelişti ve anti-aritmik ajanlarla kontrol altına alındı. Bu aritmilere bağlı bir komplikasyon

gelişmedi. Tüm hastalara düşük doz nitrogliserin uygulandı. Zaman zaman pozitif inotrop tedaviye gereksinim duyuldu. Pozitif inotropik ajanlar önerilen en düşük dozlarda kullanıldı. Postoperatif olarak hastalara geniş spektrumlu antibiyotik tercih edildi. Ağrı için non-steroid anti-inflamatuar ajanlar ve bazen narkotik ilaçlar kullanıldı. Sindirim sistemi komplikasyonlarını önlemek için H2 reseptör blokeri verildi. Ortalama yoğun bakım kalış süresi 2 ( $\pm 1-3$ ) gün, hastanede kalış süresi ise ortalama 6 ( $\pm 4-7$ ) gündü. Erken postoperatif dönemde mortalite ve morbidite olmadı. Bir hastada yüzeysel cerrahi yara enfeksiyonu gelişti ve sistemik antibiyotik ile tedavi edildi. Mediastinal ve retrosternal enfeksiyon hiçbir hastada görülmedi. Bir hastada sol ventrikül yetmezliği nedeni ile intraaortik balon pompası kullanıldı. Erken dönemde ciddi nörolojik, pulmoner, renal, multiorgan sorun ya da enfeksiyon oluşmadı. Oral beslenmeye geçildiğinde antiagregan tedavi ve taburcu olurken antihiperlipidemik tedavi verildi.

Opere edilen olguların (n=21) 17'si (%81) erkek, 4'ü (%19) kadın ve ortalama yaşları;  $66.33 \pm 8.91$  (ortalama  $\pm$  SS), AOS;  $74.86 \pm 25.92$  dakika ve TPS;  $99.29 \pm 28.97$  dakika idi. Olguların 7'sine ikili bypass (%33), 8'ine üçlü bypass (%38.1), 5'ine dördü bypass (%23.8) ve birine de 6'lı bypass (%4.8) yapıldı. Olgu başına düşen anastomoz sayısı ortalama  $3.05 \pm 1.02$  idi. Anastomoz sayısı ile AOS ve anastomoz sayısı ile TPS arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu ( $p < 0.001$ ).

## TARTIŞMA

Önemli LMCA oklüzyonlu (>%50) olgular kalp yetmezliğiyle sonuçlanan LV işlev bozukluğu ve ölüme yol açan yaygın anterolateral infarktüs riski taşırlar (1,2,5,9). Bu olguların çoğunda angina pectoris vardır (11). Olguların tümünde diğer koroner arterlerde de önemli lezyonlar ve angina pectoris vardı.

LMCA hastalığı için, öykü, muayene ve laboratuvar olarak özgün bir bulgu yoktur. Kesin tanı ancak koroner anjiyografi ile konabilir (11).

LMCA darlığında medikal tedavinin cerrahi revaskülarizasyona göre oldukça başarısız ve ölümcül sonuçlara yol açtığı bir çok araştırmada belirtilmiş ve cerrahi girişimin mortalite ve morbiditeyi önemli oranda azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı vurgulanmıştır (3,5-9). İskemiye azaltmak için medikal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda intraaortik balon pompası önerilmektedir (1).

Biz bir olguda intraaortik balon pompasını preoperatif olarak başlatıp, postoperatif dönemde hasta kalp işlevi yeterli olduğunda sonlandırdık.

Koroner arter bypass cerrahisi esnasında uygulanan aortik krosklemp süresince miyokard korunmasının postoperatif sorunların azaltılması, morbidite ve mortalite açısından çok büyük önemi vardır. Miyokard korunmasının temellerini hipotermi ve kardiyopleji oluşturur. Kardiyopleji solusyonları kristaloid ve kan kardiyoplejisi olarak içeriklerine göre ikiye ayrılmaktadır ve ısılarına göre de soğuk, sıcak ve ılık olarak kullanılmaktadırlar.

Günümüzde diğer açık kalp cerrahisi işlemlerinde olduğu gibi koroner arter cerrahisinde de geliştirilmiş kardiyopleji solusyonları farklı verilmiş teknikleriyle başarıyla kullanılmaktadır.

Kardiyoplejinin antegrad, retrograd ve bu ikisinin kombine olarak kullanılması şeklinde üç verilmiş yolu vardır. Antegrad uygulamada asendan aortaya yerleştirilen bir kanül aracılığıyla aort köküne verilen kardiyopleji solusyonu koroner ostiumlardan miyokarda dağılmaktadır. Retrograd uygulamada koroner sinüsten bir kanül aracılığıyla kardiyopleji solusyonu verilmektedir. Kombine uygulamada antegrad ve retrograd uygulamalar birlikte yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ve deneyimler her yöntemin avantajları ve dezavantajları olduğunu göstermiştir. Kardiyoplejinin sadece kendisi değil, aynı zamanda tüm miyokard dokusuna dağılması da önemli bir noktadır. Retrograd yolun sol ventrikül korunmasında faydalı olduğu söylenmektedir. Bununla birlikte değişken veya kombine olarak koroner sinüs, aorta ya da ven greftlerinden verilerek yapılan korumanın daha önemli ve yararlı olduğu ileri sürülmüştür. Miyokard korunmasının yaşamsal önemi açık olmasına karşın Cernaianu ve arkadaşları özellikle bazı risk gruplarında klinik sonuçların antegrad ya da retrograd yol seçimine göre değişmediğini göstermişlerdir. Devamlı retrograd ile aralıklı antegrad kardiyopleji ya da her ven greftinden verilen antegrad kardiyopleji karşılaştırıldığında birbirlerine belli bir üstünlük sağlayamamışlardır (22, 23).

LMCA oklüzyonu nedeniyle acil şartlarda opere ettiğimiz hastalarda miyokard korunması için 28-32°C arası ısıda orta hipotermi uyguladık. Kardiyopulmoner bypass başlangıcında soğuk kan kardiyopleji, bitişinde hot-shot kardiyopleji kullandık. Çalışmadaki LMCA oklüzyonu oranlarımız

% 50-80 arasında değişmekteydi. Distal anastomozlarımızı (olgu başına ortalama anastomoz sayısı  $3.05 \pm 1.02$  olarak gerçekleşti) genelde tek kardiyopleji süresinde tamamladık. Kardiyopleji verilmiş tekniği olarak başlangıçta antegrad, distal anastomozlar sonrasında ise safen konduitletlerden uygulamayı tercih ettik.

Retrograd yolun kullanılmaması bir tercihtir. Günümüzde genel olarak kabul görmüş bir kardiyopleji yaklaşımının bulunmaması, değişik yöntemlerin farklı katkılarını, gözardı etmememizi gerektirmektedir. Bu noktadan yola çıkarak tek bir yöntemle bağlı kalınmaması kanaatini taşımakla birlikte, miyokardın korunmasındaki izlenecek yöntemin cerrahin kişisel bir seçimi olduğu da hatırlanmalıdır (22, 23).

Distal ve proksimal anastomozlar yapılırken tek aortik krosklemp tekniği kullanıldı. Bu teknik, özellikle koroner bypass geçiren hastalarda miyokardiyal korumada ve postoperatif seyirde herhangi bir yan etki oluşmadan serebral korumayı düzelttiği için tercih edilmiştir (12-15). Serebrovasküler olaylar halen kardiyak cerrahi uygulanan hastalardaki en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Tek aortik krosklemp tekniği ile bu hastalardaki nörolojik komplikasyonların azaldığı rapor edilmiştir (23). Olguların tamamında erken dönemde serebral hasar olmamıştır. Pulmoner, renal ya da multiorgan sorunlar ve ciddi enfeksiyonlar özellikle acil koroner bypass yapılanlarda sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Preoperatif risklerin de var oluşu tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır (17-20). Aort oklüzyon süresi uzadıkça bu sorunlar daha da sık görülmektedir (16,17). Olgularımızda herhangi bir komplikasyon gelişmemiş, yüzeysel bir yara enfeksiyonu dışında ciddi bir enfeksiyonla karşılaşmamıştır. Total revaskülarizasyon morbidite ve mortalite oranlarını düşürmektedir (21). Kliniğimizde olguların tamamında natür damar yatağı elverdiği ölçüde total revaskülarizasyon yapılmaya çalışılmıştır ve olgu başına ortalama anastomoz sayısı  $3.05 \pm 1.02$  olarak bulunmuştur. AOS;  $74.86 \pm 25.92$  ve TPS;  $99.29 \pm 28.97$  olarak gerçekleşmiştir. Biz kalp cerrahisindeki son ilerlemeler ve yeterli teknik alt yapıyla ciddi LMCA oklüzyonunda medikal tedavi yerine cerrahi revaskülarizasyon yapılması ve kliniğimizde opere edilen LMCA lezyonlu hastalarda mortalite ve morbidite oranlarının kabul edilebilir seviyede olduğu kanaatindeyiz.

## KAYNAKLAR

1. Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, Sheldon WC, Irrazaval M, Taylor PC, et al. Atherosclerosis of the left main coronary artery: 5 year results of surgical treatment. *Am J Cardiol.* 1979;44:195-201.
2. Bachraoui K, Mokaddem A, Selmi K, Darghouth B, Ben Halima A, Ben Naya C, et al. Left main coronary stenosis: clinical and paraclinical aspects. *Tunis Med.* 2003 Aug;81(8):567-70.
3. Holm F, Lubanda JC, Semrad M, Rohac J, Vondracek V, Miler I, et al. Main clinical and surgical determinants of in-hospital mortality after surgical revascularization of left main coronary artery stenosis: 2 year retrospective study (1998-1999). *J Mal Vasc.* 2004 May;29(2):89-93.
4. Cihan HB, Gülcan Ö, Battaloğlu B. Sol Ana Koroner Hastalığı İlave Risk Faktörü müdür? VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. 21-25 Ekim 2000;35, Antalya
5. Shigemitsu O, Hadama T, Miyamoto S, Anai H, Sako H, Iwata E. Acute myocardial infarction due to left main coronary artery occlusion. Therapeutic strategy. *Jpn J Thorac Cardiovasc Surg.* 2002 Apr;50(4):146-51.
6. Mikaeloff P, Convert G, Amouroux C, Boivin J, Van Haecke P, Friehe JP, et al. Stenosis of the left main coronary artery. Results of aorto-coronary by-pass in 67 patients (author's transl). *Nouv Presse Med.* 1981 Jan 17;10(2):89-93.
7. Gol MK, Ozsoyler I, Sener E, Goksel S, Saritas A, Tasdemir O, et al. Is left main coronary artery stenosis a risk factor for early mortality in coronary artery surgery? *J Card Surg.* 2000 May-Jun;15(3):217-22.
8. Zhou YQ. Surgical treatment of left main coronary artery stenosis. *Zhonghua Wai Ke Za Zhi.* 1991 Apr;29(4):231-2.
9. da Rocha AS, da Silva PR. Can patients with left main coronary artery disease wait for myocardial revascularization surgery? *Arq Bras Cardiol.* 2003 Feb;80(2):191-3, 187-90. Epub 2003 Feb 25.
10. Sharareh A, Furber A, Cochou O, Boulmier D, Gillard M, Allal J, et al. Is it necessary to operate quickly in patients with significant left main coronary stenosis? *Arch Mal Coeur Vaiss.* 2002 Feb;95(2):75-80.
11. Saritaş A, Keçelgil HT, Çakır Ö, Mavitaş B, Zorlutuna Y, Taşdemir O, ve ark. Sol Ana Koroner Arter Hastalığında Cerrahi Tedavi. *Turk J Cardiol.* 1993;6:73-78.
12. Tsang JC, Morin JF, Tchervenkov CI, Platt RW, Sampalis J, Shum-Tim D. Single aortic clamp versus partial occluding clamp technique for cerebral protection during coronary artery bypass: a randomized prospective trial. *J Card Surg.* 2003 Mar-Apr;18(2):158-63.
13. Bertolini P, Santini F, Montalbano G, Pessotto R, Mazzucco A. Single aortic cross-clamp technique in coronary surgery: a prospective randomized study. *Eur J Cardiothorac Surg.* 1997 Sep;12(3):413-8; discussion 419.
14. Aranki SF, Rizzo RJ, Adams DH, Couper GS, Kinchla NM, Gildea JS, et al. Single clamp technique : an important adjunct to myocardial and cerebral protection in coronary operations. *Ann Thorac Surg.* 1994 Aug;58(2):296-302; discussion 302-3.
15. Grega MA, Borowicz LM, Baumgartner WA. Impact of single clamp versus double clamp technique on neurologic outcome. *Ann Thorac Surg.* 2003 May;75(5):1387-91.
16. Gatti G, Cardu G, Lusa AM, Pugliese P. Predictors of post-operative complications in high-risk octogenarians undergoing cardiac operations. *Ann Thorac Surg.* 2002 Sep;74(3):671-7.
17. Clough RA, Leavitt BJ, Morton JR, Plume SK, Hernandez F, Nugent W, et al. The effect of comorbid illness on mortality outcomes in cardiac surgery. *Arch Surg.* 2002 Apr;137(4):428-32; discussion 432-3.
18. Sistino JJ, Acsell JR. Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) following emergency cardiopulmonary bypass: a case report and literature review. *J Extra Corpor Technol.* 1999 Mar;31(1):37-43.
19. Palao Mendoza A, Kusulas Zeron C, Palomo Villada JA. Surgical complications and mortality in octogenarian patients undergoing revascularization surgery. *Arch Inst Cardiol Mex.* 1999 May-Jun;69(3):214-21.
20. Labrousse L, de Vincentiis C, Madonna F, Deville C, Roques X, Baudet E. Early and long term results of coronary artery bypass grafts in patients with dialysis dependent renal failure. *Eur J Cardiothorac Surg.* 1999 May;15(5):691-6.
21. Nishi H, Myamoto S, Takanashi S, Minamimura H, Ishikawa T, Shimizu Y. Complete revascularization in patients with severe left ventricular dysfunction. *Ann Thorac Cardiovasc Surg.* 2003 Apr;9(2):111-6.
22. Akgün S. Erişkin Kalp Cerrahisinde Miyokard Korunması. Duran E. Kalp ve Damar Cerrahisi. Çapa Tıp Kitapevi. İstanbul. 2004,1091-106.
23. Solak H. Ekstrakorporeal Dolaşımda Miyokard Korunması. Solak H, Görmüş N. Ekstrakorporeal Dolaşım. Nobel Tıp Kitapevleri. İstanbul 2005, 35-40.



# V. azygos'un oluşum varyasyonu ve v. hemiazygos ile v. hemiazygos accessoria yokluğu

İsmihan İlknur UYSAL, Aynur Emine ÇİÇEKÇİBAŞI, Nadire ÜNVER DOĞAN,  
Ahmet Kağan KARABULUT, Taner ZİYLAN

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya

## ÖZET

62 yaşındaki bir erkek kadavranın toraks arka duvarının diseksiyonu sırasında azygos ven sistemine ait varyasyonlar tespit edildi. V. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria gelişmemişti. V. lumbalis ascendens dextra ve v. lumbalis ascendens sinistra birleşerek Th11 vertebra korpusu hizasında v. azygos'u oluşturuyordu. V. azygos orta hatta ductus thoracicus ile birlikte seyrederek Th4 vertebra hizasında v. cava superior'a açılıyordu. Columna vertebralis'in sol tarafında; 3.-10. interkostal aralıklarda bulunan venler üst, orta ve alt olmak üzere 3 adet kök oluşturarak v. azygos'a drene oluyorlardı. Azygos ven sistemindeki anatomik varyasyonların bilinmesi mediastinal cerrahi ve bölge ile ilgili radyograflerin yorumlanmasında önemlidir.

**Anahtar Kelimeler:** Vena azygos, vena hemiazygos, toraks venleri, varyasyon.

Selçuk Tıp Derg 2005; 21:21-24

## SUMMARY

**A variation in the formation of the azygos vein and a genesis of the hemiazygos vein and the accessory hemiazygos vein**

The variations were detected in the azygos vein system during dissection of the posterior thoracic wall of a 62-year-old male cadaver. The hemiazygos vein and the accessory hemiazygos vein were underdeveloped. The right and the left ascending lumbar veins united and formed the azygos vein at the level of the Th11 vertebral body. The azygos vein was coursed on the midline with the thoracic duct and ended in the superior vena cava at the level of the Th4 vertebra. On the left side of the vertebral column; the veins from 3rd to 10th intercostals spaces united and formed three trunks (superior, middle and inferior) which drained into the azygos vein separately. Knowledge of variations in the azygos vein system is important in mediastinal surgery and also in the interpretation of radiographs related with this region.

**Key Words:** Azygos vein, hemiazygos vein, veins of thorax, variation

Embriyo'nun ana venöz drenaj sistemini vv. cardinales anteriores ve vv. cardinales posteriores oluşturur. V. cardinalis posterior'un büyük kısmı geçici böbreklerle birlikte kaybolur ve yetişkinde sadece v. azygos'un kök kısmı ve v. iliaca communis'leri oluşturan bölümü kalır. V. subcardinales ve v. supracardinales zamanla v. cardinalis posterior'un yerini alır. Vv. supracardinales en son gelişen damarlar olup böbrek bölgesinde dağılırlar. Bu venler yukarıda birleşerek yetişkinde v. azygos ve v. hemiazygos'u oluştururken, aşağıda v. cava inferior'un alt parçasına dönüşür (1).

Göğüs duvarı ve interkostal aralıklardaki venöz kan, azygos ven sistemi ile v. cava superior'a drene olur. V. azygos ya L1(2) vertebra hizasında v. lumbalis ascendens dextra'nın bir dalı olarak başlar (v. azygos lumbalis) ya da Th12 vertebra

önünde v. lumbalis ascendens dextra ile v. subcostalis dextra'nın birleşmesiyle oluşur. V. azygos, hiatus aorticus'tan ya da diaphragma'nın crus dextrum'nun lifleri içinden geçerek göğüs boşluğuna girer. Columna vertebralis'in sağ tarafında, Th4 vertebra hizasına kadar yükselir, burada ön tarafa doğru yönelerek, sağ radix pulmonis'in üzerinden geçer ve v. cava superior'a açılır. İkinci, 3. ve 4. vv. intercostalis posteriores (VIP) birleşerek v. intercostalis superior'ları oluşturur. Bu venler sağda v. azygos'a, solda ise v. brachiocephalica sinistra veya v. hemiazygos accessoria'ya açılırlar. V. azygos'a ayrıca sağ alt 8 VIP, vv. mediastinales, vv. oesophageales ve vv. tracheales dökülür. V. hemiazygos ve V. hemiazygos accesoria bulunmadığı zaman columna vertebralis'in sol tarafındaki 5.-11. VIP'lar da v. azygos'a drene olur (2, 3).

Haberleşme Adresi: Dr. İsmihan İlknur UYSAL

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA e-posta: iuyosal@yahoo.co.uk


Geliş Tarihi : 9.11.2004

Yayına Kabul Tarihi : 2.2.2005


Azygos ven sistemi venleri, v. cava superior veya inferior tıkanıklığında ve portal hipertansiyonda kolleteral dolaşımı sağlayan önemli kava-kaval ve porto-kaval bağlantılardır (4).

#### OLGU

62 yaşındaki bir erkek kadavranın toraks arka duvarının diseksiyonu sırasında azygos ven sistemine ait varyasyonlar tespit edildi. V. hemiazygos ve v. hemiazygos accesoria gelişmemişti. V. lumbalis ascendens dextra, v. subcostalis, 11. VIP ve 10. interkostal aralıkta bulunan 3 adet VIP'dan son ikisinin de katılmasıyla yukarı doğru ilerliyordu. V. lumbalis ascendens sinistra ise v. subcostalis, 10. ve 11. VIP'leri alarak orta hatta yaklaşık 2 dala ayrılıyordu. Altındaki dal v. lumbalis ascendens dextra'ya dökülürken üstteki dal v. lumbalis ascendens dextra ile Th11 vertebra korpusu üzerinde birleşerek v. azygos'u oluşturuyordu. Bu venler arasındaki bağlantılar bir üçgen meydana getiriyordu. Normalden daha yukarıda oluşan v. azygos, columna vertebralis üzerinde sol tarafında bulunan ductus thoracicus ile birlikte orta hatta seyrederek Th4 vertebra hizasında v. cava superi-



Şekil 2: V. azygos (VA) oluşumunu ve ductus thoracicus (DT) ile ilişkisini gösteren şematik çizim. VIP: V. intercostalis posterior, VLAD: V. lumbalis ascendens dextra, VLAS: V. lumbalis ascendens sinistra, VCS: V. cava superior, A: üst kök, B: orta kök, C: alt kök, \*: V. azygos'u oluşturan damarların meydana getirdiği üçgen saha




Şekil 1: V. azygos (VA) un Th11 vertebra hizasında oluşumu ve columna vertebralis orta hattında seyri. VLAD: V. lumbalis ascendens dextra, VLAS: V. lumbalis ascendens sinistra, DT: Ductus thoracicus, \*: V. azygos'u oluşturan damarların meydana getirdiği üçgen saha

or'a açılıyordu (Şekil 1, Şekil 2).

Columna vertebralis'in sağ tarafında; 3. interkostal aralıkta bulunan venlerden biri 2. VIP ile, diğeri ise 4. VIP ile birleştikten sonra, 5.-9. interkostal aralıktan gelen venler ise ayrı ayrı v. azygos'a drene oluyordu. Onuncu interkostal aralıktan bulunan 3 adet venden üstteki v. azygos'a direk açılırken, son iki dal v. lumbalis ascendens dextra'ya dökülüyordu (Şekil 3).

Columna vertebralis'in sol tarafında; interkostal aralıklarda bulunan venler üst, orta ve alt olmak üzere 3 adet kök oluşturmuştu. Bu ven kökleri ductus thoracicus'un altından geçerek v. azygos'a drene oluyorlardı. Th5 vertebra korpusu hizasında v. azygos'a açılan üst köke 3.-6. VIP'lar dökülüyordu. Orta kökü 7. VIP oluştururken, 6. ve 8. VIP'lerden birer bağlantı veni bu köke katılıyordu. Orta kök oluştuktan sonra buradan ayrılan 3 dal ayrı ayrı Th7 vertebra korpusu hizasında v. azygos'a açılıyordu. Th8 vertebra korpusu hizasında v. azygos'a dökülen alt kökü ise 8. ve 9. VIP'ler ile 10. interkostal aralıktan gelen bir bağlantı veni oluşturuyordu (Şekil 4).



Şekil 3: Columna vertebralis'in sağ tarafında v. intercostalis posterior (VIP)'lerin v. azygos (VA)'a dökülmesi. VCS: V. cava superior, D: Diaphragma


## TARTIŞMA

Azygos ven sisteminin oluşumu ve yerleşimi ile ilgili çok sayıda varyasyon olduğu bilinmektedir (5-11). 200 kadavra (100 erkek, 100 kadın) üzerinde yapılan bir çalışmada 21 farklı v. azygos paterni tarif edilmiş ve bulunan varyasyonlar çift kolon tipi, geçiş tipi, tek kolon tipi olmak üzere 3 grupta sınıflandırılmıştır. V. azygos sistemindeki varyasyon oranı ise %26 olarak belirtilmiştir (5). Bizim vakamızda v. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria'nın oluşmadığı ve azygos ven sistemine ait tek kolon tipine uygun v. azygos izlenmiştir.

Kagami ve Sakai (6) 36 kadavra (26 erişkin, 10 fetus) üzerinde yaptıkları çalışmada v. azygos'un columna vertebralis ile ilişkisini araştırılmışlardır. Yetişkinlerin 22'sinde v. azygos'un columna vertebralis'in sağında ilerlerken orta kısma gelince sola doğru çaprazladığı, 3'ünde orta hatta seyrettiği, 1'inde ise columna vertebralis'in sağ tarafı boyunca ilerlediğini belirtmişlerdir. Fetüslarda ise v. azygos'un orta hattı hiç geçmediğini ya sağda ya da

ortada devam ettiğini bulmuşlar ve v. azygos'un yaşın ilerlemesiyle sola doğru yer değiştirdiğini öne sürmüşlerdir (6). Bizim olgumuzda ise v. azygos'un columna vertebralis orta hattında yer aldığı gözlenmiştir.

Krakowiak-Sarnowska ve ark. (4) 32 insan fetusunda (14 erkek, 18 dişi) yaptıkları çalışmada 5 farklı tip v. azygos sistemi tanımlanmıştır. Birinci tipte, v. hemiazygos ile v. hemiazygos accessoria'nın v. azygos'a ayrı ayrı döküldüğü (%65.6), 2. tipte, v. hemiazygos ile v. hemiazygos accessoria'nın birleşerek v. azygos'a döküldüğü (%6.25), 3. tipte, v. hemiazygos accessoria'nın oluşmadığı ve solda 4.-8. VIP'lerin ayrı ayrı v. azygos'a katıldığı (%12.5), 4. tipte, v. hemiazygos'un oluşmadığı (%6.25) ve 5. tipte ise sadece v. azygos'un bulunduğu ve orta hatta ilerlediği (%9.4) belirtilmiştir. Ayrıca Tip 1, 2, 3 ve 4'te v. azygos'un columna vertebralis'in sağ tarafında ilerlediği (% 90.6) ve çoğunlukla (% 81.25) Th4 vertebra seviyesinde sonlandığı ifade edilmiştir (4). Bizim vakamızın ise çalışmada belirtilen ve diğerlerine göre daha az



Şekil 4: Columna vertebralis'in sol tarafında v. intercostalis posterior (VIP)'ler tarafından oluşturulan üst (A), orta (B) ve alt (C) köklerin v. azygos (VA)'a katılmaları.

sıklıkta gözlenen 5. tipe benzerlik gösterdiği saptanmıştır.

Özdemir ve ark.(11)'ları bir kadavrada columna vertebralis'in sağ tarafında v. azygos'un bulunduğunu, v. hemiazygos'un ise gelişmediğini ve sol tarafta 4.-7. VIP'ların üst ve alt olmak üzere iki kök oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Üst kökün aorta'nın önünden geçerek Th4 vertebra hizasında, alt kökün ise aorta'nın arkasından geçerek Th7 vertebra hizasında, 8.-11. VIP'ların ise ayrı ayrı v. azygos'a döküldüğünü belirtmişlerdir.

Bizim olgumuzda ise v. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria'nın oluşmadığı, v. azygos'un Th11 vertebra korpusu hizasında her iki v. lumbalis ascendens tarafından oluşturulduğu ve sol tarafında bulunan ductus thoracicus ile birlikte orta hatta seyrettiği gözlemlendi. V. azygos'un toraks arka duvarında yüksek seviyede oluşması, Th11 vertebra korpusu seviyesinde venler arasında üçgen şeklinde bir anastomozun varolması ve columna vertebralis'in sol tarafında 3-10. interkostal venlerin 3 adet kök oluşturarak ductus

thoracicus'un altından geçip v. azygos'a açılması şeklinde tespit edilen varyasyonun daha önce tarif edilmediği saptandı.

Azygos ven sisteminde görülen varyasyonların embriyolojik gelişim sırasında v. subcardinales ve v. supracardinales gelişimi sırasındaki farklı geçişlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen veriler bu düşünceyi destekler niteliktedir (4, 6, 12). Azygos ven sistemindeki varyasyonların bilinmesinin, bölge ile ilgili radyolojik görüntülerin (CT, MRI, dorsolumbosacral flebografi) yorumlanması ve aorta thoracica ve mediastinum posterior tümörlerinin cerrahi tedavisinde klinisyenler açısından önemli olduğu belirtilmektedir (7, 10, 11, 13). Bizim vakamızda bulunan ve daha önce tarif edilmemiş olan bu varyasyonun bilinmesinin belirtilen klinik uygulamalarda faydalı olacağı kanaatindeyiz.

**Açıklama;** Bu vaka 26-30 Ağustos 2004 tarihinde Konya'da yapılan 8. Ulusal Anatomi Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur.

## KAYNAKLAR

- 1- Moore KL, Persaud TVN (eds). The cardiovascular system. The Developing Human-Clinically Oriented Embryology 5th ed. Philadelphia: WB Saunders;1993: 305-7.
- 2- Van De Graff KM. Veins of the thorax. Human Anatomy 5th ed. USA: Mc Graw-Hill;1998: 557.
- 3- Williams PL, Bannister LH, Berry MM, Collins P. Veins of the thorax. Gray's Anatomy, 38 th ed. New York: Churchill-Livingstone;1995: 1593-4.
- 4- Krakowiak-Sarnowska E, Wisniewski M, Szpinda M, Krakowiak H. Variability of the azygos vein system in human foetuses. Folia Morphol (Warsz) 2003;62(4):427-30.
- 5- Bergman RA, Afifi AK, Miyauchi R. Virtual Hospital: Illustrated Encyclopedia of Human Anatomic Variation. <http://www.vh.org>.
- 6- Kagami H, Sakai H. The problems in the arrangement of the azygos vein. Okajimas Folia Anat Jpn 1990;67(2-3):111-4.
- 7- Caggiati A, Barberini F. Partial agenesis of the azygos vein: a case report. Anat Anz 1996; 178(3):273-5.
- 8- Mezzogiorno A, Passiatore C. An atypic pattern of the azygos venous system in man. Anat Anz 1988;165(4):277-81.
- 9- Arslan G, Özkaynak C, Çubuk M, Sindel T, Lülecı E. Absence of the azygos vein associated with double superior vena cava- a case report. Angiology 1999;50(1):81-4.
- 10- Özbek A, Dalçık C, Çolak T, Dalçık H. Multiple variations of the azygos venous system. Surg Radiol Anat 1999;21(1): 83-5.
- 11- Özdemir B, Aldur MM, Çelik HH. Multiple variations in the azygos venous system: a preaortic interazygos vein and the absence of hemiazygos vein. Surg Radiol Anat 2002;24(1):68-70.
- 12- Biddle FG, Jung JD, Eales BA. Genetically determined variation in the azygos vein in the mouse. Teratology 1991;44(6):675-83.
- 13- Iaccarino V, Spaziante R, de Divitiis E, Stella L, Genovese L. Dorsolumbosacral phlebography. Surg Neurol 1981;15(3):198-203.

# Akciğer malign tümörüne bağlı iskelet kası metastazı

Dilek Emlik<sup>1</sup>, Mehmet Gök<sup>2</sup>, Kemal Ödev<sup>1</sup>, Demet A. Kıreşi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji AD,

<sup>2</sup>Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD.,KONYA

## ÖZET

**Amaç:** Malign tümörlerin iskelet kasına metastazları nadirdir.. Akciğerden kaynaklanan malign tümörlü olan olguda klinik bulgular ve iskelet kasındaki metastatik lezyonların klasik radyografik, BT, MRG bulguları irdelendi. **Olgu:** 68 yaşında erkek olgunun akciğer radyografisinde sol akciğerde, büyük, kalın düzensiz duvarlı kaviter lezyon izlendi. Lezyon bronkoalveolar lavaj (BAL) sonucunda kötü differensiyel epidermoid kanser tanısı aldı. Bir yıldan beri bulunan sol uyluk ön yüzündeki yumuşak doku kitlesi nedeniyle yapılan direkt grafide periost reaksiyonu dışında bulgu saptanmadı. MRG'de kitle lezyonu, çevre kas yapılarına göre T1A'lı kesitlerde hipo, T2A'lı kesitlerde hiperintens izlendi. Yumuşak doku kitlesinden yapılan biopsi sonucu metastatik tümörle uyumluydu. Olgu tanı konduktan 6 ay sonra kaybedildi. **Sonuç:** Akciğer malign tümörlü olgularda iskelet kasında kitle ve ağrı varlığında metastazdan şüphelenilmelidir. Kitlelerin lokalizasyonunda, çevre dokularla ilişkisi ve kemik tutulumunun saptanmasında MRG ve BT tamamlayıcı tetkiklerdir.

**Anahtar kelimeler:** İskelet kası metastazı, akciğer kanseri, radyoloji

Selçuk Tıp Derg 2005; 21:25-28

## SUMMARY

**Radiologic findings in skeletal muscle metastasis from lung carcinoma**

**Purpose:** In the case of the skeletal muscle metastasis of lung cancer the authors report radiographic, CT scan and MRI findings of painful masses in the femoral regions. Muscle biopsy revealed extensive infiltration of the muscle with carcinoma cells. **Case:** A 68 year-old man presented with a large cavitory lesion with thickened wall in the left hilus on radiography and CT scan. The diagnosis of the lung cancer was made by bronchoalveolar lavage. The radiograph did not show any soft tissue mass, except periosteal reaction. MRI showed a tumoral mass in the right quadriceps muscle with signal intensity slightly lower on T1-weighted and higher in T2-weighted images than surrounding muscle tissue. Needle biopsy revealed metastatic squamous cell carcinoma. The patient died six month later. **Conclusion:** MRI is more useful technique than the other methods for determination of the localization, the relationship of the surrounding tissues and the manifestations of metastatic masses on the skeletal muscle due to malign tumor of the lung.


**Key words:** Skeletal muscle metastasis, lung carcinoma, radiology

Vücut ağırlığının % 50'sini oluşturması ve total kardiyak atım hacminin büyük bir yüzdesini almasına rağmen iskelet kaslarına hematogen metastazlar nadir görülmektedir. İskelet kaslarının metastazlara karşı gösterdiği direnç kas hareketi, kas pH'ı ve kasın tümör hücrelerinin ürettiği neovaskülarizasyonu sağlayan laktik asiti atabilme yeteneğine bağlanmaktadır (1,3). Tüm bu koruma sistemlerine rağmen akciğer, meme, kolon, böbrek, over, mide, pankreas kanserlerine sekonder iskelet kasları metastazları bildirilmiştir (4-8). Literatürlerde iskelet kası metastazlarının bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülerine ait bildiriler azdır.

Sunumuzda primer akciğer tümörü tanısı alan olguda klinik bulgular ve iskelet kasında lokalize metastatik lezyonların BT ve MRG bulguları irdelendi.


## Olgu Sunumu

68 yaşındaki erkek olguda 2 yıldan beri nefes darlığı ve hemoptizi öyküsü vardı. Akciğer radyografisinde sol akciğer orta zonda periferik yerleşimli, büyük, düzensiz duvarlı kaviter lezyon izlendi. BT'de kaviter lezyonun sol akc alt lob superior segmentte olduğu saptandı. Düzensiz duvarlı kaviter lezyon çevresinde parankimal infiltrasyon ve her iki akciğerde küçük nodüler opasiteler vardı



Şekil 1. BT'de kaviter lezyonun sol akciğer alt lob superior segmentte olduğu saptandı. Düzensiz duvarlı kaviter lezyon çevresinde parankimal infiltrasyon ve her iki akciğerde küçük nodüler opasiteler vardı(ok).

(Şekil 1). Lezyon bronkoalveolar lavaj (BAL) sonucu kötü diferansiye epidermoid kanser tanısı aldı. 1 yıl sonra hastada, sol uyluk ön yüzündeki yumuşak doku kitlesi nedeniyle kas kontraktürü ve yürüme kusuru gelişti. Yapılan direkt grafide periost reaksiyonu dışında bulgu saptanmadı. BT'de sol uylukta, vastus intermedius kasında vastus medialise de uzanan, santrali nekrotik, periferik kontrast tutan yumuşak doku kitlesi izlendi. Komşu kemik kortekste düzensizlik ve kemik iliğinde kontrast tutan alanlar dikkati çekti (Şekil 2 a). MRG'de kitle, T<sub>1</sub>




Şekil 2a. BT'de sol uylukta, vastus intermedius kasında vastus medialise de uzanan, santrali nekrotik, periferik kontrast tutan yumuşak doku kitlesi izlendi (ince ok). Komşu kemik kortekste düzensizlik ve kemik iliğinde kontrast tutan alanlar dikkati çekti (kalın ok).


ağırlıklı (T<sub>1</sub>A) kesitlerde çevre kas yapılarına göre periferi hiperintens, santrali hipointens; T<sub>2</sub>A'lı kesitlerde periferi hipointens, santrali hiperintens idi. Komşu kemik iliğinde intensite değişiklikleri metastazi düşündürdü (Şekil 2 b,c). Yumuşak doku kitlesinden yapılan biopsi sonucu, metastatik tümör ile uyumlu geldi. Olgu 6 ay sonra kaybedildi.

#### Tartışma:

Malign tümörlere bağlı iskelet kası metastazları kemik metastazlarının aksine nadir tanımlanmaktadır. Kontraktilite aktivitesi, PH değişiklikleri, metabolitlerin birikimi, intramuskuler kan basıncı ve lokal sıcaklık nedeniyle iskelet kasının metastazlara dirençli olduğu düşünülmektedir (1,9,10). Willis (11) ve Pearson (12) mikrometastazları da içine aldıkları otopsi bazlı çalışmalarında kanserli hastaların %0.8-%16'sında, Berge ve arkadaşları (13) akciğer kanserli hastaların %1'inde iskelet kasına metastaz bildirmişlerdir. Kas içi metastaz yapan kanserlerin 2/3'ünü karsinomlar, 1/3'nü lösemi ve lenfomalar oluşturmaktadır. Melanom, tiroid ve akciğer kanserlerine sekonder metastazlar nadirdir (14). İntramuskuler metastazların ileri evre ve kötü diferansiye tümörlerde görülmeye meyilli oldukları ve prognozu kötüleştirdikleri bildirilmiştir (1,8). Olgumuzda primer tümör akciğerde lokalize kötü diferansiye epidermoid kanserdi ve metastaz tanısı konulduktan kısa bir süre sonra kaybedildi.



Şekil 2b. MRG'de kitle, T<sub>1</sub> ağırlıklı (T<sub>1</sub>A) kesitlerde çevre kas yapılarına göre periferi hiperintens, santrali hipointens; T<sub>2</sub>A'lı kesitlerde periferi hipointens santrali hiperintens idi (beyaz ok). Komşu kemik iliğinde intensite değişiklikleri metastazi düşündürdü (siyah ok).



Şekil 2c. MRG'de kitle, T1 ağırlıklı (T1A) kesitlerde çevre kas yapılarına göre periferi hiperintens, santrali hipointens; T2A'lı kesitlerde periferi hipointens santrali hiperintens idi(ok). Komşu kemik iliğinde intensite değişiklikleri metastazi düşündürdü.

İskelet kası metastazi akciğer tümörünün başlangıç semptomu olarak da ortaya çıkabilir. Ana semptom genellikle derin yerleşimli, sert ve ağrılı kitle olmakla birlikte, asemptomatik olan olgular da vardır (15). Yapılan bir çalışmada primer akciğer tümörü olan olgularda iskelet kası metastaz tanısının, evreleme ve tedaviye cevabı değerlendirme için yapılan BT'de tesadüfen konulduğu bildirilmiştir (1). Ayrıca travmaya maruz kalan hastalarda metastazların görülme insidansı arttığı rapor edilmiştir. Travma nedeni ile iskelet kası fizyolojisi bozulmakta ve fokal hiperemi meydana gelmektedir. Bunun sonucunda kasın hem laktik asidi atma yeteneği azalır hem de metastatik

hücrelerin kas içine yerleşme eğilimi artar. Bu yüzden ayırıcı tanıda aynı klinik bulguları veren hematoma, kas yırtılması ve enfeksiyon da düşünülmeli ve olgular travma yönünden sorgulanmalıdır (1,16). Olgumuzda primer akciğer tümörü tanısı önceden konulmuştu. Travma hikayesi olmayan olgumuzda uyluk kaslarında, ağrılı, sert, ele gelen kitle lezyonu nedeniyle yürüme kusuru vardı.

Literatürde iskelet kası metastazları, BT'de kas grubu içerisinde düzensiz konturlu düşük dansiteli alanlar şeklinde tanımlanmıştır (17). Pretorius ve arkadaşları (1) kas içi metastazları kontrastlı BT kesitlerinde halka tarzında periferik kontrast tutan, santrali hipodens alanlar şeklinde tanımlamışlardır. MRG'de ise lezyonlar T1A'lı kesitlerde çevre kaslarla izo/hipointens, kontrastlı incelemede kontrast tutan, T2A'lı kesitlerde hiperintens olarak saptanmıştır (7,15). Benign ve malign tümörlerin her ikisinde de tanımlanan kas ödemi MRG'de kolayca görülen yaygın bir özelliktir. BT görüntüleme ödemi göstermede yetersiz kalabilmesine rağmen, özellikle T2A'lı MRG'de ödem rahatlıkla saptanabilir (1). İskelet kası metastazların BT ve MRG görünüşleri nonspesifik olduğundan tanı genellikle biopsi ve immunohistokimyasal çalışmalar ile konulmaktadır (1,15).

Sonuç olarak kanserli olgularda kas hacminde artma, yumuşak doku kitlesi, ağrı ve kas kontraktürü varsa öncelikle metastazdan şüphelenilmelidir. Lezyonları değerlendirirken direkt grafi tetkiki basamak olarak atlanmamalıdır. Kitle lezyonu ve çevre dokularla ilişkisini değerlendirmede mükemmel kontrast rezolüsyonu ve multiplanar görüntü alabilme yeteneği nedeniyle MRG, BT'den üstün ancak, her iki yöntem birbirlerinin tamamlayıcısıdır.

## KAYNAKLAR

- 1- Pretorius ES, Fishman EK. Helical CT of skeletal muscle metastases from primary carcinomas. *AJR* 2000; 174: 401-4.
- 2- Nicolson GL, Poste G. Tumor implantation and invasion at metastatic sites. *Int Rev Exp Pathol* 1983; 25: 77-181.
- 3- Seely S. Possible reasons for high resistance of muscle to cancer. *Med Hypotheses* 1980; 6: 133-7.
- 4- Larson DA, Bottles K, Federle M, Fippin L, Luce J. Skeletal muscle metastases from pancreatic cancer. *Onkologie* 1998; 11: 282-5.
- 5- Nakada J, Onodera S, Shirai T, Igarashi H, Nishida A, Iwasaki M, Tokeishi M. A case of muscle metastasis of renal cell carcinoma treated by local resection and tensor fascia lata myocutaneous flaps. *Hinyokika Kyo* 1994; 40: 1013-6.
- 6- Araki K, Kobayashi M, Ogata T, Takuma K. Colorectal carcinoma metastatic to skeletal muscle. *Hepatogastroenterology* 1994; 41: 405-8.
- 7- Suto Y, Yamaguchi Y, Sugihara S. Skeletal muscle metastasis from lung carcinoma: MR findings. *J Comput Assist Tomogr* 1997; 21: 304-5.
- 8- Sridhar KS, Rao RK, Kunhardt B. Skeletal muscle metastases from lung cancer. *Cancer* 1987; 59: 1530-4.
- 9- Acinas Garcia O, Fernandez FA, Satue EG, Buelta L, Val-Bernal JF. Metastasis of malignant neoplasm to skeletal muscle. *Rev Esp Oncol* 1984; 31: 57-67.
- 10- Williams JB, Youngberg RA, Bui-Mansfield LT, Pitcher JD. MR imaging of skeletal muscle metastases. *AJR* 1997; 168: 555-7.

- 11- Willis RA. Secondary tumors in sundry unusual situations. In: Willis RA; ed. The Spread of Tumours in the Body. London: Butterworths; 1973: 279.
- 12- Pearson, CM. Incidence and type of pathologic alterations observed in muscle in a routine autopsy survey. Neurology 1959; 9: 757.
- 13- Berge J, Lundberg S. Cancer in Malmö 1958-1969: an autopsy study. Acta Pathol Microbiol Scand (A) 1977; 260(suppl): 67-8.
- 14- Auerbach O, Garfinkel L, Parks VR. Histologic type of lung cancer in relation to smoking habits, year of diagnosis and sites of metastases. Chest 1975; 65: 382-7.
- 15- Sudo A, Ogihara Y, Shiokawa Y, Fujinami S, Sekiguchi S. Clin Orthop and related research. 1993; 296: 213-7.
- 16- Magee T, Rosenthal H. Skelètal muscle metastases at sites of documented trauma. AJR 2002; 178: 985-8.
- 17- Schultz SR, Bree RL, Schwob RE, Raiss G. CT detection of skeletal muscle metastases. J Comput Assist Tomogr 1986; 10: 81.



# Ateş ve nedeni bilinmeyen ateşe yaklaşım

Meltem ENERJİN, Ahmet SERT, Özgür PİRGON

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Ünitesi, KONYA

Ateş, vücut sıcaklığının günlük oynamalarının üstüne çıkması olarak tanımlanan bir belirtidir. Patogenezi tam olarak bilinmez. Isı regülasyonunda hipotalamustaki merkezlerin rolü olduğu, ateş yükselmesinin moleküler düzeyde değişikliklerle ilişkili olduğu bilinmektedir.

Sağlıklı bireylerde çevre ısısındaki değişimlere karşın vücut sıcaklığı 36,5-37°C arasında sabit tutulur. Bazı kişilerde normal vücut sıcaklığı bu sınırların altında veya üstünde olabilmektedir. Vücut sıcaklığı sirkadiyen olup normalde günlük oynamalar 0,6 °C kadardır. Vücut sıcaklığı sabah erken saatlerde en düşük, 16.00-18.00 arasında en yüksektir.

Ateşin gidişi değişik şekillerde olabilir. Remitant ateşte günlük oynamalar yine olmakla birlikte sıcaklık hiçbir zaman normal düzeylere inmez. İntermitant ateşte ısı normale inebilir. Günlük oynamalar 1,4 °C 'den fazla ise hektik ateş olarak adlandırılır. Sürekli ateşte günlük oynamalar 0,3 °C'den azdır.

Ateşe neden olan pirojen maddeler ekzojen veya endojen olabilir. Ekzojen pirojenler konağın dışından gelir. Ekzojen pirojenlerin büyük bir çoğunluğunu mikrobiyal ürünler, toksinler veya mikropların kendisi oluşturur. Enfeksiyonlara, herhangi doku hasarına, enflamasyona veya antijenik uyarıya konak endojen pirojenler oluşturarak yanıt verir.

İnterlökin-1 $\beta$  ve İnterlökin-1 $\alpha$ , Tümör Nekroz Faktörü- $\alpha$ , Tümör Nekroz Faktörü- $\beta$ , İnterlökin-6 ve İnterferon- $\alpha$  endojen pirojenik sitokinlerdir. Sitokinler hipotalamusu direkt olarak uyararak Prostaglandin E2 oluşumuna neden olurlar; daha sonra termoregülatuar eşik yükselerek ısı oluşumu ve korunması sağlanır ve vücut sıcaklığı yükselir. Endojen pirojenlere olan yanıt ekzojen pirojenlere göre daha erken olup 10-15 dk. civarındadır.

DeneySEL çalışmalarda vücut sıcaklığının artması ile konağın savunma işlevlerinin arttığı gösterilmiştir. Ateş ile T ve B hücre yanıtı, sitolitik T hücre oluşumu, immünglobülin yapımı artmakta, mikrop üretmesi baskılanmaktadır.

Ağır egzersiz, hipertiroidi, malign hipertermi, fazla giyinme, örtünme ile ısı kaybının önlenmesi, atropin

zehirlenmesi, yüksek çevre ısısı gibi durumlarda gözlenen hipertermi, hipotalamik değişikliklerle ilgili değildir, endojen ısı fazlalığı ile ilgilidir (1).

Ateş, nöbet sırasında ortaya çıkan kas kasılmalarından kaynaklanabilir. Ateş, aynı zamanda hipotalamik bölgeden kaynaklanan paroksizmal nöbet boşalmasının tek klinik bulgusu olabilir (2).

Çocuklarda ateşin etiyolojik sınıflandırılması Tablo-1' de gösterilmiştir (2).

## ÇOCUKLARDA NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ

### TANIM

Nedeni Bilinmeyen Ateş terimi hastaneye yatışın 1 hafta sonrasında ve ayaktan tedavi gören hastaların değerlendirilmesinden 3 hafta sonrasında sebebi teşhis edilemeyen ve ölçmeyle kanıtlanan ateşli çocuklar için kullanılır.

Bu kriterlerde buluşmayan, özellikle de ne infeksiyöz teşhisli ne de noninfeksiyöz teşhisli, aşıkarda olmayan, hastaneye yatırılan hastalar lokal bulgusu olmayan ateşi olanlar olarak değerlendirilebilir. Bu hastalarda kısmen kısa süre içinde ek klinik bulguların gelişmesiyle hastalığın infeksiyöz özelliği doğrulanır.

Hiperpireksi, vücut sıcaklığının 41 °C 'den daha fazla olması olarak tanımlanır. Bu durum, yaygın değildir ve ciddi bakteriyel enfeksiyonla ilişkili değildir. Hiperpireksili bebek ve çocuklar, ateşi olan bütün çocuklarda olduğu gibi dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir (3).

### KLİNİK DEĞERLENDİRME

#### 0-90 GÜNLÜK BEBEKLER

#### YENİDOĞAN DÖNEMİ (0-30 GÜN)

Yenidoğanın, 'olgunlaşma' ile ilişkili humoral ve hücreSEL bağışıklık yetersizlikleri vardır. Benzer biçimde, yenidoğanın hastalığa davranışsal yanıtları da sınırlıdır. Bu durum, klinik değerlendirmeyi zorlaştırır.

Yenidoğan viral enfeksiyonlar yanı sıra perinatal bakteriyel enfeksiyonlar açısından da risk altındadır. Sonuç olarak yaşamın ilk 4 haftası içinde belirlenmiş ateş, ayrıntılı bir değerlendirmeyi zorunlu kılar.

Haberleşme Adresi:

**Dr. Meltem Enerjin** S. Ü. Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Sosyal Pediatri Ünitesi, KONYA

e-posta: [menergin@yahoo.co.uk](mailto:menergin@yahoo.co.uk)

Geliş Tarihi : 17.2.2004

Yayına Kabul Tarihi : 26.06.2005

Selçuk Tıp Derg 2005; 21:29-34

**Tablo 1:** Çocuklarda ateşin etiyolojik sınıflandırılması

<b>I. Enfeksiyonlar</b>	7. Kene ateşi	16. Tromboflebit	VII. Kan hastalıkları
a) Solunum enfeksiyonları	8. Babesiozis	17. Diskit	1. Hemolitik anemi
1. Rinit	9. Fare ısırığı hastalığı	<b>II. Kollajen vasküler hastalıklar</b>	2. Transfüzyon reaksiyonu
2. Akut rinosinüzit	10. Sitomegalovirüs enfeksiyonu	1. Romatizmal ateş	3. Lösemi
3. Orta kulak iltihabı	11. Leptospiroz	2. Serum hastalığı	4. Orak hücreli anemi
4. Mastoidit	12. Q ateşi	3. Dermatomyozit	<b>VIII. Hemoraji</b>
5. Pnömoni	13. Kayalık dağlar lekesi ateşi	4. Periarteritis nodosa	1. Kanama bozuklukları
6. Tüberküloz	14. Psittakozis	5. Bebeklerdeki poliarteritis nodosa	2. İntrakranial kanamalar
b) İdrar yolu enfeksiyonları	15. Lyme hastalığı	6. Sistemik Lupus Eritematozus	3. Adrenal kanama
c) Eksantermeler	16. Tularemi	7. Jüvenil Romatoid Artrit	4. Tümör içine kanama
d) Barsak enfeksiyonları	17. Trişinozis	8. Miks bağ dokusu hastalığı	<b>IX. Yüksek çevre ısısı</b>
1. Salmonellozis	18. Blastomikozis	<b>III. Neoplastik hastalıklar</b>	<b>X. Çeşitli Sebepler</b>
2. Campilobakter enteriti	19. Viserel larva migrans	1. Lösemi	1. Kawasaki sendromu
3. Askaris	20. Malarya	2. Hodgkin hastalığı	2. Periyodik hastalık
4. Amebiasis	21. Kedi tırmığı hastalığı	3. Ewing sarkomu	3. Ailevi Akdeniz Ateşi
e) Santral Sinir Sistemi enfeksiyonları	22. Toksoplazmozis	4. Kemik metastazlı nöroblastoma	4. Takayasu arteriti
1. Menenjit	23. Tüberkülozis	<b>IV. Dehidratasyon</b>	5. Virilizan adrenal hiperplazi
2. Ensefalit	24. Toksik şok sendromu	1. Hipertonik dehidratasyon	6. Ektodermal displazi
3. Poliyomyelit	25. Bubonik veba	2. Diabetes insipidus	7. İnfantral kortikal hiperostozis
f) Karaciğer ve safra yolu enfeksiyonları	26. Brusellozis	<b>V. İlaçlar ve aşılama</b>	8. İnflamatuvar barsak hastalığı
1. İnfeksiyöz hepatit	27. Ehrlşiozis	1. İlaç ateşi	9. Paroksizmal atriyal taşikardi
2. Kronik agresif hepatit	ı) Abseler ve lokalize enfeksiyonlar	2. Atropin zehirlenmesi	10. Hipertiroidinin toksik krizi sırasında
3. Kolanjit	1. Osteomyelit	3. Aşı cevabı	11. Sarkoidoz
4. Karaciğer absesi	2. İntrakranial abse	4. Salisilat zehirlenmesi	12. Postperikardiotomi sendromu
5. Granümatöz hepatit	3. Serebrit	<b>VI. Nörolojik bozukluklar</b>	13. Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi
g) Kalbi tutan enfeksiyonlar	4. Akciğer absesi	1. Santral Sinir Sistemi bozuklukları	14. Yenidoğanın narkotik yoksunluğu
1. İnfektif endokardit	5. Perinefritik abse	2. Nöbetler	15. Fabry hastalığı
2. Myokardit	6. Apendiküler abse	3. Familial disotonomi	16. Periyodik ateş, aftöz stomatit ve farenjit.
h) Sistemik enfeksiyonlar	7. Pelvik abse	4. Kernikterusla birlikte olan konjenital familial non-hemolitik sarılık	17. Munchausen sendromu
1. Bakteriyemi	8. Mediastinit	5. Krabbe hastalığı	<b>XI. Nedeni Bilinmeyen Ateş</b>
2. Epstein-Barr Virüsü enfeksiyonu	9. Karaciğer absesi	6. Servikal omurilik tümörü	<b>XII. Hiperpireksi</b>
3. Histoplazmozis	10. Subfrenik abse	7. Serebrospinal sıvı şant enfeksiyonu	
4. Epidemik influenza	11. Spinal epidural enfeksiyon		
5. Herpes virüs tip-6	12. Pürülan perikardit		
6. Enterovirüs enfeksiyonları	13. Ampiyem		
	14. Bronşektazi		
	15. İmmün yetmezlik hastalığı		

Yenidoğan döneminde lomber ponksiyon (LP), değerlendirmenin gerekli bir parçasıdır. Çünkü iyi görünümülü ateşli yenidoğanlarda menenjit ve diğer ciddi bakteriyel enfeksiyonlar (CBE) bildirilmiştir (4, 10).

Ateşli yenidoğan genellikle hastaneye yatırılır ve kültürler sonuçlanana dek antibiotik tedavisi verilir. Antibiyotik tedavisi, yenidoğanın en sık karşılaşılan patojenlerini ( B grubu streptokoklar, E. coli ve diğer gram negatif basiller ile Listeria monocytogenes) hedef alır ve genellikle Ampisilin ve bir aminoglikozitten oluşur.

Öykü ve fizik inceleme bulguları destekliyse, asiklovir ile antiviral tedavi de eklenebilir (Şekil 1) (11).

### 31-90 GÜNLÜK (1-3 AYLIK) BEBEKLER

31-90 günlük bebekler için yaklaşım düşük ya da yüksek risk ölçütlerine göredir (Şekil 2) (12).

Bebekler hasta görünümülü veya laboratuvar bulguları

→ HASTANEYE YATIR.

→ SEPSİS DEĞERLENDİRMESİ YAP.


- Tam kan sayımı (PY dahil ) ve kan kültürü
- İdrar incelemesi ve idrar kültürü
- Lomber ponksiyon
- Akciğer grafisi

→ ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ BAŞLA.

- Ampisilin ve aminoglikozit (ven yoluyla)

**Şekil 1:** 0-30 günlük ateşli (ATEŞ >38 °C) bebeklerde yaklaşım anormalse (yüksek risk), CBE olasılığı %10 dolayındadır. Düşük risk grubundaki bebeklerde CBE riski %1-2'dir. Bu bebekler antibiyotik verilerek ya da verilmeden ayakta izlenebilir. Ayaktan izlem, yalnızca hastanın ertesi gün mutlaka görüleceği ve ailenin durumun önemini kavrayabildiği koşullarda düşünülmelidir.

Lomber ponksiyon kararı hekime bağlıdır. Ancak, ampirik antibiyotik uygulanacaksa LP mutlaka




Şekil 2: 31-90 günlük ateşli (ATEŞ>38°C) bebeklerde yaklaşım

yapılmalıdır. Çünkü, bebek düzelmez ve izlemde pleositoz belirlenirse, durumun kısmen tedavi edilmiş bakteriyel menenjit mi veya viral/aseptik menenjit mi olduğu konusu sorun yaratacaktır.

1-3 aylık bebeklerde sepsis ve menenjite neden olan patojenler (Streptococcus pneumoniae, H. influenzae

tip b, N. meningitidis ) genellikle toplumsal kaynaklıdır. Ancak, özellikle 4-8 hafta grubunda geç yenidoğan enfeksiyonu etkenleriyle örtüşmeler olabilir. Hastaneye yatırılan 1-3 aylık bebeklerde ampirik tedavi üçüncü kuşak bir sefalosporin ve sıklıkla, Listeria monocytogenes enfeksiyonu için ampisilinden oluşur (12).



- 1a) İdrar incelemesi (veya idrarda lökosit esteraz ve nitrit) ve idrar kültürü yapılır 12 aylıktan küçük kız çocuklarda, 6 aylıktan küçük erkek çocuklarda, 6-12 aylık sünnetsiz erkek çocuklarda İdrar incelemesi sonucu normal değilse ayaktan antibiyotik tedavisi başlanır.
- 1b) İdrar incelemesi (veya idrarda lökosit esteraz ve nitrit ) yapılır.  
12-24 aylık kız çocuklarda, 6-12 aylık sünnetli erkek çocuklarda İdrar incelemesi sonucu normal değilse , idrar kültürü gönderilir ve ayaktan antibiyotik tedavisi başlanır.
- 2) Ay büyüdükçe daha seçici olmak üzere , idrar incelemesi (veya idrarda lökosit esteraz ve nitrit ) ve idrar kültürü için hastaya göre karar verilir  
24 aylıktan büyük kız çocuklarda, 12 aylıktan büyük erkek çocuklarda
- 3) Ateş  $>39,5^{\circ}\text{C}$  olan ve konjuge pnömokok aşısı yapılmamış çocuklarda;  
Tam kan sayımı istenir: BK sayısı  $>15.000/\text{mm}$  (veya mutlak nötrofil sayısı  $>10.000/\text{mm}$  ) ise kan kültürü istenir ve seftriakson  $50\text{mg}/\text{kg}$  (en çok 1g) başlanır.
- 4) Akciğer grafisi;Solunum sıkıntısı, takipne, ral, SaO<sub>2</sub>  $<95\%$  varsa veya Ateş  $>39,5^{\circ}\text{C}$  ve BK  $>20.000/\text{mm}$  ise istenmeli
- 5) Ateş için parasetamol  $10-15\text{ mg}/\text{kg}/\text{doz}$  (en çok  $60\text{ mg}/\text{kg}/\text{gün}$  ) 4-6saat ara ile veya ibuprofen  $10\text{ mg}/\text{kg}/\text{doz}$  (ençok  $60\text{ mg}/\text{kg}/\text{gün}$ ) 4-6 saat ara ile verilir.
- 6) Ateş 48 saatten uzun sürerse veya çocuğun durumu kötüleşirse getirilmesi istenir.  
Ayaktan izlenen çocukların kültürlerinde üreme varsa:  
Kan ve idrar kültürü (patojen yönünden) pozitif:  
a) Ateş devam ediyor veya çocuk hasta görünüyorsa:  
a. Hastaneye yatır,  
b. Sepsis açısından değerlendir ve araştır ,  
c. Parenteral antibiyotik başla.  
b) Ateş düşmüş ve çocuk iyiyse ayaktan antibiyotik başla.

- a. Herhangi bir laboratuvar incelemesi ve antibiyotik tedavisi gerekmez.
- b. Ateş için parasetamol  $10-15\text{mg}/\text{kg}/\text{doz}$  (en çok  $60\text{ mg}/\text{kg}/\text{gün}$ ) 4-6 saat ara ile veya ibuprofen  $10\text{mg}/\text{kg}/\text{doz}$  (en çok  $60\text{mg}/\text{kg}/\text{gün}$  ) 4-6 saat ara ile
- c. Ateş 48 saatten uzun sürerse veya çocuğun durumu kötüleşirse getirilmesi istenir

Şekil 3: 3-36 aylık ateşli (ATEŞ $>38^{\circ}\text{C}$ ) çocuklarda yaklaşım

### 3-36 AYLIK ÇOCUKLAR

3-36 aylık ateşli çocuklarda CBE için risk altındaki çocukları ve yaklaşımı belirlemek için laboratuvar incelemeleri yardımcıdır. Ancak, CBE belirlenmesi için hiçbir test %100 duyarlı değildir. Hasta görünmeyen, ateşli, 3-36 aylık bir çocukta öncelikle bir enfeksiyon odağı aranmalıdır. En sık ateş nedeni viral ÜSYE (Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu)'dir. Bu yaş grubunda en sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyonlar otitis media, İYE (İdrar Yolu Enfeksiyonu) ve pnömonidir. Bu yaş grubundaki ateşli çocuklar özellikle gizli bakteriyemi ve İYE yönünden araştırılmalıdır. İYE, bebekler ve küçük çocuklarda en sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyondur (13, 16).

Ateşi 38,3 °C'nin üstünde ve enfeksiyon odağı belirlenememiş süt çocukları ve 12-24 aylık kızların %5'inde İYE belirlenir (17).

Bir yaşından küçük kızlar ve sünnetsiz erkek çocuklarda bu risk çok artar. Bakteriyemi sıklığı, ateşi 39,5 °C'den yüksek ve BK (Beyaz Küre) sayısı 15000/mm<sup>3</sup>'ün üstünde olan çocuklarda %13 iken, ateş ve BK sayısı bu değerlerin altında olan çocuklarda % 3 bulunmuştur. Mutlak nötrofil sayısının 10000/mm<sup>3</sup> üstünde olması da bakteriyemi açısından yararlı bir ipucudur. Gizli bakteriyemi, görünürde enfeksiyon odağı olmayan bakteriyemi olarak tanımlanır. *S. pneumoniae*, *N. meningitidis* ve *Salmonella* yüzünden gizli bakteriyemi kısmen iyi görünümü, ateşli 3-36 aylık çocukların yaklaşık %1.5'inde ortaya çıkar. *S. pneumoniae*, gizli bakteriyemi vakalarının % 90'ını açıklamaktadır. Tedavi edilmezse, gizli bakteriyemi sekel bırakmadan kendiliğinden iyileşebilir, sebat edebilir veya süpüratif artrit, selülit, pnömoni, menenjit gibi lokal enfeksiyonlara yolaçabilir. Sekel hem konakçı faktörleri hem de mikroorganizma ile ilişkili olabilir. Bazı çocuklarda gizli bakteriyemi geçici bir hastalık durumundan ziyade ciddi lokal enfeksiyonun erken belirtisini gösterebilir (3). Gizli bakteriyemili çocuklarda CBE'lerin önlenmesi için ağızdan kullanılan antibiyotiklerin etkin olduğunu gösteren çalışma yoktur. Birkaç çalışma ise, parenteral antibiyotik kullanımının gizli bakteriyemili çocuklarda CBE'leri önlediğini göstermiştir. Yapılan bir çalışmada, tedavi verilmeyen pnömokokal bakteriyemili çocuklarda, ağızdan veya parenteral antibiyotik kullanan çocuklara göre geçmeyen ateş veya bakteriyemi ve hasta-

neye yatış oranı daha yüksek bildirilmiştir (1, 8).

1993 kılavuzu, ateşi 39 °C'yi aşan ve enfeksiyon odağı bulunmayan 3-36 aylık çocuklar için iki tutucu yaklaşım önermiştir (12):

1- Kan kültürü al ve bütün çocukları tedavi et.

2- Bütün hastalardan tam kan sayımı ve kan kültürü al, BK sayısı 15000/mm'den veya mutlak nötrofil sayısı 10000/mm'ten çok olanları tedavi edilmelidir.

Bu yaklaşımlar güncel kılavuzlarda değiştirilmiştir (19). Güncel uygulamada gizli bakteriyemi için değerlendirme, ateşi 39,5 °C'nin üstünde ve konjuge pnömokok aşı dizisi yapılmamış çocuklar için önerilir. Bu hastalardan tam kan sayımı ve kan kültürü alınmalı, BK 15000/mm'den veya mutlak nötrofil sayısı 10000/mm'den çok olanları tedavi edilmelidir. Tedavide 50mg/kg (en çok 1g) dozuyla seftriakson (kas veya ven yoluyla) kullanılır. Antibiyotik verilecekse, öncesinde kan kültürü mutlaka alınmalıdır. Akciğer grafisi, dışkı kültürü, LP konusunda hastaya göre karar verilmelidir. Kılavuz önerilerinin çoğu hekimce bilinmesine karşın, uygulama hekimler arasında fark eder. Gizli bakteriyemi çoğu kez kendiliğinden düzelir. Bu nedenle birçok hekim, hastasını çok sıkı bir iletişim içinde, evde ve antibiyotik kullanmadan yakından izlemeyi yeğlemektedir.

Öte yandan, izlem sorunları olduğunda, antibiyotik kullanımını artmakta, hatta hastaneye yatış bile söz konusu olmaktadır. Ancak hangi yol tutulursa tutulsun en önemli yol izlemdir (Şekil 3) (12).

### SONUÇ

Sonuç olarak ateş nedeniyle getirilen hastalarda gerekli yaklaşım basamak şeklinde uygulanmalı ve nedeni bilinmeyen akut ateş vakalarında yapılacak işlemlerden önce hasta dikkatli bir şekilde gözlenmelidir. Bu tedavi ve hasta takibinde gözönünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır.

### KAYNAKLAR

1. Yalçın I. Enfeksiyon hastalıkları. O. Neyzi, T. (Yüksel) Ertuğrul (ed) Pediatri 3. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002: 473.
2. M. Green. Signs and Symptoms. Pediatric Diagnosis 6th ed. Philadelphia: W.B.Saunders Company; 1998: 202-3.
3. Powell K. Fever Without a Focus. In: R. E. Behrman, R. M. Kliegman, H. B. Jenson, editors. Nelson Textbook of Pediatrics, 17th ed. Philadelphia: Saunders; 2004: 841.
4. Pray LG. Lumbar puncture as a factor in the pathogenesis of meningitis. Am J Dis Child. 1941;62:295-308.

5. Teele DW, Dashesky B, Klein JO. Meningitis after lumbar puncture in children with bacteremia. *N Engl J Med.* 1981;305:1079-81.
6. Carroll WL, Farrell MK, Singer JI, et al. Treatment of occult bacteremia: a prospective randomized clinical trial. *Pediatrics.* 1983;72:608-12.
7. Hamrick JH, Murphy TF. Bacteremia in 28 ambulatory children. *Clin Pediatr.* 1978;17:109-12.
8. Rosenberg N, Cohen SN. Pneumococcal bacteremia in pediatric patients. *Ann Emerg Med.* 1982;11:2-6.
9. Woods ER, Merola JE, Bithoney WG, et al. Bacteremia in an ambulatory setting. Improved outcome in children treated with antibiotics. *Am J Dis Child.* 1990;144:1195-9.
10. Shapiro ED, Aaron NH, Wald ER, et al. Risk factors for the development of bacterial meningitis among children with occult bacteremia. *J Pediatr.* 1986;109:15-9.
11. Jaskiewicz JA, McCarthy CA, Richardson AC, et al. Febrile infants at low risk for serious bacterial infection-an appraisal of the Rochester criteria and implications for management. *Pediatrics.* 1994;94:390-6.
12. Baraff LJ, Bass JW, Fleisher GR, et al. Practice guideline for the management of infants and children with fever without source 0-36 months of age. *Pediatrics.* 1993;92:1-12.
13. Shaw KN, Gorelick M, McGowan KL, et al. Prevalence of urinary tract infection in febrile young children in the emergency department. *Pediatrics.* 1998;102:e16. Available at: <http://www.pediatrics.org/cgi/contents/full/102/2/e16>.
14. Hoberman A, Chao HP, Keller DM, et al. Prevalence of urinary tract infection in febrile infants. *J Pediatr.* 1993;123:17-23.
15. Bauchner H, Philipp B, Doshesky B, et al. Prevalence of bacteriuria in febrile children. *Pediatr Infect Dis J.* 1987;6:239-242. 70.
16. American Academy of Pediatrics. Practice parameter: the diagnosis, treatment, and evaluation of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children. Committee on Quality Improvement. Subcommittee on Urinary Tract Infection. *Pediatrics.* 1999;103:843-52.
17. Hoberman A, Wald ER. Urinary tract infections in young febrile infants. *Pediatr Infect Dis J.* 1997;16:11-7.
18. Lee GM, Harper MB. Risk of bacteremia for febrile young children in the post-Haemophilus influenzae type b era. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 1998;152:624-8.
19. Kuppermann N. Occult bacteremia in young febrile children. *Pediatr Clin North Am.* 1999;46:1073-109.